Инструкция по применению
Остенил 1 % 20 мг/2 мл Шприц 1 шт

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Германия
Производитель: Чемедика
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гиалуронат натрия
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 20 мг/2 мл
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Гиалуронат натрия

Состав

Действующее вещество: Натрия гиалуронат (Natrii hyaluronas). Концентрация действующего вещества (мг): 20

Форма выпуска

Раствор

Показания

При болях и ограниченной подвижности при дегенеративно-дистрофических и травматических изменениях тазобедренного, коленного сустава и других синовиальных суставов.

Способ применения и дозы

Препарат может вводить только врач, имеющий соответствующее разрешение (или другие специалисты в соответствии с требованиями местного законодательства), знакомый с техникой инъекций препаратов в синовиальный сустав, подлежащий лечению, и в медицинском учреждении, оборудованном для проведения внутрисуставных инъекций. При введении необходимо строго придерживаться правил асептики. Препарат следует вводить только в полость сустава. Инъекции в некоторые синовиальные суставы требуют контроля средствами визуализации для обеспечения точного расположения иглы и во избежание повреждения прилегающих жизненно важных структур. Траектория иглы при внутрисуставных инъекциях, выполняемых с визуализацией или без нее, должна выбираться так, чтобы избежать повреждения прилегающих жизненно важных структур. Перед инъекцией место введения препарата необходимо протереть ватным тампоном со спиртом или другим подходящим антисептическим раствором.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость. различные воспалительные заболевания суставов (ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева и т. д.), беременность. кормление грудью.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется использовать у детей, беременных и кормящих женщин.

Побочные действия

Боль, ощущение тепла, покраснение, опухание, аллергическая реакция.

Взаимодействие с другими препаратами

Информация о несовместимости изделия медицинского назначения Остенил Плюс с другими растворами для внутрисуставного применения на данное время отсутствует. В течение первых дней после инъекции можно рекомендовать прием обезболивающих или противовоспалительных препаратов внутрь.

Особые указания

Препарат с признаками повреждения стерильной упаковки или шприца, а также с истекшим сроком годности (указан на коробке) использованию не подлежит.

Условия хранения

Беречь от детей