Инструкция по применению
Остенил Мини 10 мг/мл 1 мл шприц

Характеристики

Форма выпуска: Ампулы
Страна: Германия
Производитель: Чемедика
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гиалуронат натрия
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 10 мг/мл

Действующее вещество

Гиалуронат натрия

Состав

Шприцы - 1 шт.: Действующее вещество: 10 мг натрия гиалуроната в 1 мл изотонического раствора; Вспомогательные вещества: хлорида натрия, моногидрогенфосфат натрия, дигидрогенфосфат натрия, вода для инъекций. Один заранее заполненный шприц 10 мг/ 1.0 мл препарата в стерильной упаковке. Остенил® Мини – это средство медицинского назначения. Стерилизован путем автоклавирования.

Форма выпуска

Ампулы

Показания

Заболевания суставов. Остеоартроз (Остеоартит). Артроз. Артрит. Дегенеративные заболевания суставов. Артрит височно-нижнечелюстного сустава. Остеоартроз височно-нижнечелюстного сустава. Внутрисуставное введение препарата показано при болях и ограниченной подвижности при дегенеративно-дистрофических и травматических изменениях мелких синовиальных суставов, в том числе суставов кистей и стоп, локтевого, височно-нижнечелюстного и фасеточных суставов.

Способ применения и дозы

Инъекции препарата делаются в больной сустав 1-3 раза с интервалом в неделю. Одновременно можно лечить несколько суставов. В зависимости от серьезности заболевания суставов, положительный эффект от лечебного цикла, включающего три внутрисуставные инъекции, длится в течение, по крайней мере, шести месяцев. Повторные циклы лечения могут проводиться по требованию. В случае наличия выпота в суставе рекомендуется уменьшить его объем путем удаления жидкости из полости, отдыха, применения льда и/или внутрисуставной инъекции кортикостероида. Лечение препаратом может быть начато через 2-3 дня. Содержимое и внешняя поверхность заранее заполненного шприца препаратом сохраняют стерильность до тех пор, пока не будет разорван пакет. Выньте заранее заполненный шприц из упаковки, снимите колпачок Luer со шприца, наденьте нужную канюлю (например, 19-25G) и закрепите ее, слегка повернув. Перед инъекцией выпустите пузырьки воздуха из шприца.

Противопоказания

Препарат не должен использоваться больными, страдающими ярко выраженной чувствительностью к одному из компонентов.

Побочные действия

Локальные вторичные явления, такие как боли, ощущение тепла, покраснение и опухание могут наблюдаться на суставе, в который введен препарат. Наложение льда на сустав в течение 5-10 минут снимут все подобные явления.

Взаимодействие с другими препаратами

На сегодняшний день нет никаких сведений относительно несовместимости препарата с другими растворами для внутрисуставного использования. Для облегчения состояния больной может принимать оральные анальгезирующие средства или противовоспалительные лекарства в течение нескольких первых дней процедур.

Особые указания

Особое внимание необходимо пациентам, страдающим гиперчувствительностью по отношению к лекарствам. Необходимо соблюдать общие меры предосторожности для внутрисуставных инъекций. Препарат должен аккуратно вводиться в полость сустава. Необходимо не допустить попадания препарата в кровеносные сосуды или окружающие ткани! Поскольку нет никаких клинических данных относительно использования гиалуроновой кислоты у детей, препарат не рекомендуется к использованию беременными женщинами и кормящими матерями, а также больными, страдающими воспалительными заболеваниями, например, ревматоидным артритом или болезнью Бехтерева. Не используйте препарат в случае, если заранее заполненный шприц или стерильная упаковка повреждены. Внутрисуставное введение препарата осуществляется только врачом-специалистом!