Инструкция по применению
Остенил плюс Раствор для внутрисуставного введения 40 мг/2 мл Шприц 1 шт

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Германия
Производитель: Чемедика
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гиалуронат натрия
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 40 мг/2 мг
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Гиалуронат натрия

Состав

натрия гиалуронат - 20 мг маннитол - 5 мг вода для инъекций - до 1 мл натрия хлорид; натрия гидрофосфат; натрия дигидрофосфат

Форма выпуска

Раствор

Показания

Внутрисуставное введение Остенила показано при болях и ограниченной подвижности при дегенеративно-дистрофических и травматических изменениях тазобедренного, коленного сустава и других синовиальных суставов.

Способ применения и дозы

Внутрисуставно. Допускается к использованию исключительно врачом.Остенил Плюс вводится в полость пораженного сустава однократно. По показаниям лечение может быть дополнено 1–2 инъекциями с интервалом в 14 дней. Одновременно можно выполнять инъекции и в другие суставы.При наличии в суставе выпота следует сначала произвести его эвакуацию, обеспечить суставу покой и использовать холодовую терапию или внутрисуставное введение кортикостероидного препарата. Лечение изделием медицинского назначения Остенил Плюс можно начинать через 2–3 дня после этих процедур.Содержимое и внешняя поверхность наполненного шприца с изделием медицинского назначения ОстенилПлюс стерильны, пока не нарушена целостность упаковки и укупорочная система шприца. Укупорочная система состоит из защитного колпачка, люэровского наконечника и крышки для защиты от несанкционированного вскрытия.Перед проведением инъекции необходимо:Вынуть наполненный шприц с изделием медицинского назначения Остенил Плюс из стерильной упаковки.Перегнуть крышку для защиты от несанкционированного вскрытия шприца в одну и другую стороны так, чтобы фиксирующие ее перемычки сломались.Аккуратно вверх снять крышку вместе с защитным колпачком. Присоединить необходимую по размеру (18–25 G) стерильную иглу и закрепить ее, слегка повернув.Перед инъекцией выпустить из шприца пузырьки воздуха в случае их наличия.

Противопоказания

Остенил не должен использоваться больными, страдающими ярко выраженной чувствительностью к одному из компонентов.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется использовать у детей, беременных и кормящих женщин.

Побочные действия

После внутрисуставного введения изделия медицинского назначения Остенил Плюс могут наблюдаться локальные вторичные явления, такие как боль, ощущение тепла, покраснение и припухание. Наложение льда на пунктированный сустав в течение 5–10 мин позволяет купировать подобные явления.

Особые указания

Препарат с признаками повреждения стерильной упаковки или шприца, а также с истекшим сроком годности (указан на коробке) использованию не подлежит.

Условия хранения

В прохладном темном месте