Инструкция по применению
Nature's Bounty Остео би-флекс Таблетки массой 1680 мг 40 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Nature's Bounty
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 40
Срок годности: 36.0



Описание

Способствует уменьшению боли и дискомфорта в суставах при движении. Помогает поддерживать здоровье и подвижность суставов. Способствует замедлению разрушения внутрисуставного хряща. Стимулирует синтез основных компонентов хряща, входящего в структуру сустава.Хондроитин сульфат - это высокомолекулярное мукополисахаридное вещество животного происхождения. Такой компонент входит в состав множества эффективных препаратов. Основная функция - стимуляция процесса регенерации хрящевой ткани. Оказывает обезболивающее и противовоспалительное воздействия.Хондроитин - стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, укрепляя соединительнотканные структуры: хряща, сухожилий, связок. Глюкозамина гидрохлорид тормозит процессы дегенерации хрящей. Это хондропротектор, который стимулирует обмен веществ в костной и хрящевой ткани. Глюкозамин - питает суставы и соединительную ткань, препятствует разрушению, полностью закрепляет результат леченияКомбинация хондроитина и глюкозамина благоприятно влияет на состояние суставов, повышает их амортизационные способности и поддерживает гибкость.При заболевании позвоночной области применение препаратов, содержащих эти элементы, рекомендуется для снижения неприятных ощущений.

Состав

Глюкозамина гидрохлорид, патентованная смесь Joint Shield TM, Хондроитин сульфат, Коллаген, Смола босвеллии (Босвеллия Серрата), Запатентованный материал 5 LOXIN, Экстракт смолы босвеллии, содержащий 20% босвеллиевой кислоты), Витамин С (L-Аскорбиновая кислота), Марганец (сульфат марганца), гиалуроновая кислота, Бор (борат натрия) - 1680 мг

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника витамина С, источника марганца, бора, глюкозамина, хондроитинсульфата, содержащей метилсульфонилметан и босвеллиевые кислоты.

Способ применения и дозы

Принимать по 1 таблетке 2 раза в день или по 2 таблетки сразу после еды со стаканом воды.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

В сухом месте