Инструкция по применению
Остеогенон Таблетки покрытые оболочкой 830 мг 40 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Франция
Производитель: Pierre Fabre
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Оссеин гидроксиапатитное соединение
Количество в упаковке: 40
Дозировка действующего вещества: 830 мг
Срок годности: 48 месяцев

Действующее вещество

Оссеин гидроксиапатитное соединение

Состав

В 1 таблетке препарата: оссеин-гидроксиапатитного комплекса содержится 291мг оссеина (неколлагеновых пептидов и белков - 75мг, коллагеновых белков &ndash, 216 мг) и 444 мг гидроксиапатита (кальция &ndash, 178мг, фосфора &ndash, 82мг). Состав оболочки: гипромеллоза, титана диоксид, макрогол, тальк, железа оксид желтый.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Кальций, входящий в состав Остеогенона, содержится в виде гидроксиапатита (в соотношении с фосфором 2:1), что способствует более полному его всасыванию из пищеварительного тракта. После приема препарата внутрь отмечается хорошее и равномерное всасывание кальция, входящего в его состав.

Показания

* Профилактика и лечение первичного остеопороза различной этиологии (пременопаузный, менопаузный, сенильный), * профилактика и лечение вторичного остеопороза различной этиологии (обусловленного ревматоидным артритом, заболеваниями печени и почек, гипертиреозом, гиперпаратиреозом, несовершенным костеобразованием, применением ГКС, гепарина, иммобилизацией), * коррекция остеопении и нарушений фосфорно-кальциевого обмена (в т.ч. при беременности и в период грудного вскармливания), * ускорение заживления переломов костей.

Способ применения и дозы

Взрослым при остеопорозе рекомендуется принимать внутрь по 2-4 таб. 2 раза/сут, по другим показаниям - по 1-2 таб./сут. Продолжительность лечения определяется состоянием пациента

Противопоказания

* Тяжелая почечная недостаточность, * гемодиализ, * выраженная гиперкальциурия, * детский возраст, * повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Остеогенон может применяться при беременности и в период грудного вскармливания по показаниям после консультации врача.

Побочные действия

* В очень редких случаях (<,1/1 000 000) возможны: аллергические реакции, * при длительном применении &mdash, гиперкальциемия, гиперкальциурия.

Передозировка

Лечение бессимптомной гиперкальциемии (см. раздел «Способ применения и дозы»). Поскольку Рокальтрол® является производным витамина D, для него характерны такие же симптомы передозировки. Прием больших доз кальция и фосфатов одновременно с Рокальтролом® может вызвать похожие симптомы. Показатель произведения концентрации кальция и фосфора в сыворотке (CaxP) не должен превышать 70 мг2 /дл2. Развитию гиперкальциемии может способствовать высокое содержание кальция в диализате. Симптомы острого отравления витамином D: анорексия, головная боль, рвота, запоры. Симптомы хронического отравления: дистрофия (слабость, потеря веса), расстройства чувствительности, возможна лихорадка с жаждой, полиурией, обезвоживанием, апатия, задержка роста и инфекции мочевых путей. Последствиями гиперкальциемии являются очаговое обызвествление коркового слоя почек, миокарда, легких и поджелудочной железы. Лечение случайной передозировки: немедленное промывание желудка или прием препаратов, вызывающих рвоту, для предупреждения дальнейшего всасывания. Для выведения препарата с калом в качестве слабительного применяют вазелиновое масло. Рекомендуется повторно определять уровень кальция в сыворотке. Если повышенный уровень сывороточного кальция сохраняется, можно назначить фосфаты и кортикостероиды, а также принять меры для обеспечения достаточного диуреза.

Взаимодействие с другими препаратами

Остеогенон замедляет всасывание препаратов железа, бисфосфонатов и антибиотиков группы тетрациклина, поэтому при одновременном применении с этими препаратами интервал времени между их приемом должен составлять не менее 4 ч. При одновременном применении Остеогенона с витамином D или тиазидными диуретиками врачу следует оценить степень риска развития гиперкальциемии вследствие усиления резорбции кальция.

Особые указания

У пациентов, предрасположенных к мочекаменной болезни, может потребоваться коррекция режима дозирования препарата в зависимости от лабораторных показателей. У пациентов с нарушениями функции почек следует избегать длительного применения высоких доз препарата. В состав препарата входят лишь следовые количества натрия хлорида, поэтому допустимо использование Остеогенона у пациентов с артериальной гипертензией.

Условия хранения

Беречь от детей