Инструкция по применению
Остеохель С Таблетки гомеопатические 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 50



Описание

Биорегуляционный немецкий препарат. Применяется в комплексной терапии воспалительных и обменно-деструктивных заболеваний костной ткани и надкостницы.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на 1 таблетку): Активные компоненты: Hekla-Lava (Гекла-Лава) D6 30 мг, Kalium iodatum (Калиум иодатум) D4 30 мг, Asa foetida (Аза фетида) D4 30 мг, Stillingia sylvatica (Стиллингия сильватика) D4 30 мг, Araneus diadematus (Аранеус диадематус) D6 30 мг, Natrium sulfuricum (Натриум сульфурикум) D4 30 мг, Hydrargyrum oxydatum rubrum (Гидраргирум оксидатум рубрум) D9 60 мг, Calcium phosphoricum (Кальциум фосфорикум) D6 60 мг, Вспомогательные вещества: магния стеарат 1,5 мг, лактозы моногидрат до получения таблетки массой около 0,302 г.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В комплексной терапии воспалительных и обменно-деструктивных заболеваний костной ткани и надкостницы.

Способ применения и дозы

По 1 таблетке 3 раза в день. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания. Длительность курса лечения согласовывается с врачом.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных. С осторожностью: заболевания щитовидной железы, в связи с наличием активного компонента, содержащего йод.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Редко - повышенное слюноотделение.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При заболеваниях щитовидной железы применение препарата возможно только после консультации с врачом. При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение), в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При появлении побочных эффектов также следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Информация для пациентов с сахарным диабетом: 1 таблетка препарата содержит 0,025 хлебной единицы. Пенал закрывать сразу после применения препарата.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте! 5 лет. Не применять по истечении срока годности.