Инструкция по применению
Остеомед Таблетки покрытые оболочкой 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Остеомед
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60



Описание

Таблетки Остеомед способствуют восстановлению костной ткани без риска отложения кальция в мягких тканях. Препарат укрепляет кости. В месте перелома обеспечивает костные структуры необходимыми питательными веществами и помогает быстрому восстановлению кости в период реабилитации. Ускоряет сращивание костей в месте перелома.

Состав

Цитрат кальция (200 мг), гомогенат трутнево-расплодный, или HDBA органик комплекс (100 мг). Активные компоненты Гомогенат трутневый способствует повышению уровня андрогенов, что улучшает ремоделирование костных тканей, опосредованно стимулирует активность остеобластов, повышает количество остеоцитов. Аминокислоты, входящие в состав трутневого гомогената, участвуют в формировании коллагена, который формирует костную матрицу. Цитрат кальция. Кальций, входящий в состав «Остеомеда», содержится в нём в виде цитрата кальция, что способствует более полному и безопасному его всасыванию из ЖКТ. Препятствует вымыванию кальция из костной ткани, предупреждает образование камней в почках. Участвует в метаболизме, происходящем в клеточном и межклеточном пространстве. Обеспечивает правильное функционирование ряда биологических систем. Не содержит витамин D3 как самостоятельный компонент. Подходит тем, у кого нет потребности в дополнительном приёме данного витамина. Наличие большого количества природного витамина D в составе трутневого гомогената способствует усвоению кальция без риска развития гипервитаминоза D.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

При потере эластичности и возникновении ломкости волос и ногтей, наблюдении симптомов облысения; для профилактики и коррекции остеопении и сопутствующих костных заболеваний — артрита, артроза, остеохондроза, пародонтоза и пародонтита.

Способ применения и дозы

Взрослым по 2 таблетки 3 раза в сутки или 1 таблетка утром, 2 — днем и 3 вечером во время еды. Курсовой прием — не менее 1 месяца. При необходимости повторить курс с перерывом в 5–10 дней (пауза — обязательно, для полного усвоения компонентов).

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности, кормлении грудью.

Побочные действия

Возможно возникновение аллергических реакций.

Особые указания

Противопоказано при индивидуальной непереносимости компонентов.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.