Инструкция по применению
Отинум капли ушные 20% 10 г

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Польша
Производитель: Меда Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Холина салицилат
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 20%
Срок годности: 36.0

Описание

Торговое наименование: ОТИНУМ Международное непатентованное или группировочное наименование: холина салицилат Лекарственная форма: капли ушные Описание: Прозрачный раствор от бесцветного до слабо окрашенного в желтый цвет с характерным запахом, свободный от посторонних частиц. Фармакотерапевтическая группа: НПВП Код АТХ: [S02DA]

Действующее вещество

Холина салицилат

Состав

1 г препарата содержит: Активное вещество: Холина салицилат 0,200 г Вспомогательные вещества: Глицерол 0,130 г Этанол 96% 0,100 г Хлорбутанола гемигидрат 0,005 г Вода очищенная до 1,000 г

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

При применении Отинума местно системного действия не отмечается

Показания

Для симптоматического облегчения ушной боли при остром среднем отите, хроническом среднем отите, наружном отите, мирингите. Размягчение затвердевшей ушной серы перед процедурой ее удаления из уха.

Способ применения и дозы

При остром и хроническом среднем отите, мирингите и наружном отите Закапывают в наружный слуховой проход по 3-4 капли 3-4 раза в сутки. Курс лечения должен составлять не более 3 дней. Для размягчения «серных пробок» перед их удалением Закапывают по 3-4 капли в наружный слуховой проход два раза в сутки на протяжении 4 дней. Перед использованием ушных капель рекомендуется согреть флакон, подержав его в руке, во избежание неприятных ощущений, связанных с попаданием холодной жидкости в ухо. Капли следует закапывать больному, лежащему на боку таким образом, чтобы его ухо было направлено вверх. После процедуры больному следует в течение нескольких минут оставаться в том же положении. Нет необходимости изменять режим дозирования для лиц пожилого возраста, детей и больных с нарушениями функции печени и почек. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Противопоказания

Частота развития не установлена. Местные реакции гиперчувствительности: зуд, покраснение кожи. Заболевания уха: использование препарата у больных с перфорацией барабанной перепонки может привести к нарушению слуха. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью

Ограничения к применению: беременность

Побочные действия

При применении этого лекарственного средства возможно проявление таких негативных эффектов: • ощущение жжения; • аллергические проявления. При продолжительном применении средства, а также при лечении людей, у которых диагностирована перфорация барабанной перепонки, возможно нарушение слуха

Передозировка

Случаи передозировки препаратом не встречаются при его местном применении

Взаимодействие с другими препаратами

Данный препарат увеличивает действие других противовоспалительных, анальгезирующих и жаропонижающих средств.

Особые указания

С осторожностью Аллергический («сенный») насморк, полипы слизистой оболочки носовых ходов. Применение при беременности и в период грудного вскармливания Применение препарата во время беременности и у кормящих матерей противопоказано из-за отсутствия соответствующих исследований Передозировка Передозировка препарата при закапывании в ухо невозможна. Один флакон препарата содержит 2 грамма холина салицилата. При случайном проглатывании такое количество препарата может быть опасно только для новорожденных. Симптомы Симптомы, которые могут появиться при передозировке при проглатывании: спутанность сознания, головокружение, повышенное потоотделение, рвота, шум в ушах и гипервентиляция. После проглатывания очень больших количеств лекарственного препарата могут появиться симптомы угнетения ЦНС, такие как сонливость, заторможенность, судороги и кома. Лечение Помощь при передозировке при пероральном приеме: - удаление холина салицилата из организма (вызвать рвоту, промыть желудок, принять активированный уголь), - контроль состояния пациента (прежде всего - водного и электролитного баланса), - симптоматическое лечение (в том числе коррекция водного и электролитного баланса, в случаях, когда концентрация салицилата превышает 300 мг в литре - форсированный диурез). Взаимодействие с другими лекарственными средствами Нет данных, указывающих на взаимодействие холина салицилата с другими лекарственными средствами при закапывании его в ухо. Особые указания У детей младше 1 года лекарственный препарат может применяться только под пристальным наблюдением врача. Производные салициловой кислоты при попадании в среднее ухо через поврежденную барабанную перепонку могут вызвать нарушение слуха или глухоту. В связи с этим препарат не следует применять без предварительного осмотра оториноларинголога и без инструкций врача. Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Срок хранения после открытия

28.0

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении