**Инструкция по применению**
**Отирелакс Капли ушные 15 мл**

### Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Румыния
Производитель: К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лидокаин+Феназон
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 40 мг+10 мг/1 г
Срок годности: 6.0




### Действующее вещество

Лидокаин+Феназон

### Состав

В 1 г содержится 40 мг феназона, 10 мг лидокаина гидрохлорида. Вспомогательные вещества: натрия тиосульфата пентагидрат, этанол 96%, глицерол, натрия гидроксид (раствор 1М), вода очищенная

### Форма выпуска

Капли

### Фармакокинетика

Активные компоненты препарата при неповрежденной барабанной перепонке в системный кровоток не поступают

### Показания

Для местного симптоматического лечения и обезболивания у взрослых и детей (включая новорожденных) при:— наружном отите;— в комплексной терапии среднего отита с неповрежденной барабанной перепонкой;— баротравматическом отите

**Способ применения и дозы**

Ушные капли Отирелакс закапывают взрослым, предварительно подогрев раствор до температуры тела, в наружный слуховой проход 2-3 раза в день по 4 капли на протяжении 7-10 суток. При отсутствии эффекта на 2-3 день закапывания, необходимо откорректировать лечение. При назначении препарата в комбинации с другими препаратами в форме ушных капель, следует выдерживать 30 минутный интервал между закапываниями. Важно — перед началом процедуры необходимо поверить состояние барабанной перепонкиОтирелакс детям — возможно закапывание детям различного возраста, в том числе и новорожденным

**Противопоказания**

Гиперчувствительность к препарату или производным пиразолона, травматическая или постинфекционная перфорация барабанной перепонки.В период беременности и лактации — после обязательной консультации с врачом

**Применение при беременности и кормлении грудью**

В период беременности и лактации — после обязательной консультации с врачом

**Побочные действия**

Болезненность при закапывании, гиперемия и раздражение кожи слухового прохода, аллергические реакции

**Передозировка**

Данные отсутствуют

**Взаимодействие с другими препаратами**

Клинически выраженной симптоматики при взаимодействии Отирелакса с другими ЛС не выявлено

**Срок хранения после открытия**

180.0

**Условия хранения**

В сухом месте