Инструкция по применению
Отофа Капли ушные 10 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Франция
Производитель: Лаборатуар Фармастер
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Рифамицин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2.6 г
Срок годности: 36.0

Описание

Капли ушные 2.6% в виде прозрачного раствора красно-желтого цвета.

Действующее вещество

Рифамицин

Состав

Состав (на 100 мл): Действующее вещество: Рифамицин натрия.....2,6 г, что соответствует 2 000 000 ЕД Вспомогательные вещества: Макрогол 400..... 25,000 г Аскорбиновая кислота.....0,500 г Динатрия эдетат.....0,012 г Калия дисульфит.....0,150 г Лития гидроксид.....0,135 г Очищенная вода..... до 100 мл

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Бета-аланин является аминокислотой. Противодействует резкому высвобождению гистамина, но не обладает антигистаминной активностью благодаря отсутствию блокады HI-рецепторов. Бета-аланин имеет прямое воздействие на кожную периферическую вазодилятацию, которая обусловливает вегетативные «приливы», ощущение тепла, жара, головную боль. На физиологическом уровне вазомоторные «приливы» обусловлены активностью терморегуляторных центров в гипоталамусе, приводящей к периферической кожной вазодилятации. Это следствие реакций, происходящих при нарушении баланса церебральных нейротрансмиттеров, наступающем после прекращения секреции гормонов яичниками. Препарат способствует насыщению периферических рецепторов нейротрансмиттеров, которые участвуют в этом процессе.

Показания

Острые и хронические отиты: наружный отит. острые средние отиты (в т. ч. при перфорации барабанной перепонки). хронические средние отиты. состояния после оперативных вмешательств на среднем ухе.

Способ применения и дозы

Взрослым: закапывают в ухо по 5 капель 3 раза в сутки или вводят марлевую турунду с предварительно нанесенным на неё препаратом в наружный слуховой проход 2 раза в сутки. Препарат может быть использован для промывания барабанной полости через аттиковую канюлю. Детям: закапывают в ухо по 3 капли 3 раза в сутки или вводят марлевую турунду с предварительно нанесенным на неё препаратом в наружный слуховой проход 2 раза в сутки. Длительность лечения - не более 7 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к рифамицину или другим компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не используется при беременности и кормлении грудью (применяется только у женщин климактерического возраста или с искусственно вызванной менопаузой).

Побочные действия

Редко - кожные аллергические реакции: крапивница, кожный зуд, мелкоточечная кожная сыпь.

Передозировка

В связи с низкой степенью абсорбции в системный кровоток передозировка маловероятна.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие не описано.

Особые указания

Перед использованием ушных капель рекомендуется согреть флакон, подержав его в руке, во избежание неприятных ощущений, связанных с попаданием холодной жидкости в ухо. Следует избегать контактов препарата с одеждой, т.к. раствор может оставлять пятна на ткани. Местные реакции: розовая окраска барабанной перепонки (видимая при отоскопии). Беременность и период грудного вскармливания Адекватных и строго контролируемых исследований безопасности применения препарата в периоды беременности и лактации не проводилось. При беременности и лактации применение возможно, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка. Влияние на способность управлять автомобилем и другими транспортными средствами Нет данных об отрицательном влияние препарата на способность управлять автомобилем и другими транспортными средствами.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении