Инструкция по применению
Паглюферал-2 Таблетки 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: МОСКОВСКАЯ ФФ
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бромизовал+Кальция глюконат+Кофеин+Папаверин+Фенобарбитал
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 0.035 г+ 0.1 г+0.0075 г+0.015 г+0.25 г
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Бромизовал+Кальция глюконат+Кофеин+Папаверин+Фенобарбитал

Состав

Фенобарбитал 35 мг, бромизовал 100 мг, кофеин бензоат натрия 7.5 мг, папаверина гидрохлорид 15 мг, кальция глюконат 250 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Фенобарбитал: всасывается медленно, полностью. Cmax в плазме крови определяется через 1-2 ч, связь с белками плазмы - 50%. Метаболизируется в печени, индуцирует микросомальные ферменты печени CYP3A4, CYP3A5, CYP3A7 (скорость ферментативных реакций возрастает в 10-12 раз). Кумулирует в организме. T1/2 составляет 2-4 суток. Выводится почками в виде глюкуронида, около 25% - в неизмененном виде. Проникает в грудное молоко и через плацентарный барьер. Кофеин: абсорбция хорошая, происходит на всем протяжении кишечника. Cmax в плазме крови достигается через 50-75 мин. Быстро распределяется во всех органах и тканях, проникает через ГЭБ и плаценту. Связь с белками крови (альбуминами) - 25-36%. Метаболизму в печени подвергается более 90%, у детей первых лет жизни - до 10-15%. У взрослых около 80% дозы кофеина метаболизируется и параксантин, около 10% - в теобромин и около 4% - в теофиллин. Эти соединения впоследствии деметилируются в монометилксантины, а затем в метилированные мочевые кислоты. T1/2 у взрослых - 3.9-5.3 ч (иногда до 10 ч). Выведение кофеина и его метаболитов осуществляется почками.Папаверин: биодоступность в среднем - 54%. Связь с белками плазмы - 90%. Хорошо распределяется, проникает через гистогемагические берьеры. Метаболизируется в печени. T1/2 - 0.5-2 ч (может удлиняться до 24 ч). Выводится почками в виде метаболитов.Кальция глюконат: приблизительно 1/5-1/3 часть всасывается в тонком кишечнике. Около 20% выводится почками, остальное количество удаляется с содержимым кишечника (активно выделяется стенкой терминального отдела ЖКТ).

Показания

Эпилепсия.

Способ применения и дозы

Внутрь после еды.Дети:3 - 4 года: по 1 таблетке 2 раза в день5 - 6 лет: по 1,5 таблетки 2 раза в день7 - 9 лет: по 2 таблетке 2 раза в день10 - 14 лет: по 2,5 таблетки 2 раза в деньДети с 14 лет и взрослые:по 4 таблетки 2 раза в день

Противопоказания

Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата;Выраженная печеночная и /или почечная недостаточность;Лекарственная зависимость (в том числе в анамнезе); Гиперкинезы;Миастения;Выраженная анемия;Порфирия;Сахарный диабет; Гипофункция надпочечников;Гипертиреоз;Депрессия;Бронхообструктивные заболевания;Активный алкоголизм;Беременность;Период лактации;Данная лекарственная форма не применяется у детей до 3-х лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Головокружение;Общая слабость;Атаксия;Дизартрия;Нистагм;Парадоксальная реакция (особенно у пожилых и ослабленных больных-возбуждение);Галлюцинации;Нарушение сна;Тошнота;Рвота;Запор или диарея;Повышение активности печеночных трансаминаз;Агранулоцитоз;Мегалобластная анемия;Тромбоцитопения;Снижение или повышение артериального давления;Тахикардия;Аритмия (в том числе экстрасистолия);Атриовентрикулярная блокада;Аллергические реакции;Лекарственная зависимость (при длительном применении).

Передозировка

Симптомы: усиление выраженности побочных эффектов.Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Фенитоин и вальпроаты повышают содержание фенобарбитала в сыворотке крови. Действие фенобарбитала снижается при одновременном приеме с резерпином, увеличивается при сочетании с амитриптилином, ниаламидом, диазепамом, хлордиазепоксидом.Снижает эффективность пероральных контрацептивов и салицилатов.Снижает содержание в крови непрямых антикоагулянтов, ГКС, гризеофульвина, доксициклина, эстрогенов и других лекарственных средств, метаболизирующихся в печени по пути окисления (ускоряет их метаболизм). Усиливает действие этанола, нейролептиков, наркотических анальгетиков, миорелаксантов, седативных и снотворных средств.Ацетазоламид, ощелачивая мочу, снижает реабсорбцию фенобарбитала в почках и ослабляет его эффект.Снижает антибактериальную активность антибиотиков и сульфаниламидов, противогрибковое действие гризеофульвина.

Особые указания

Больным с незначительной гиперкальциурией, снижением клубочковой фильтрации или с нефролитиазом в анамнезе назначение препарата должно проводиться под контролем содержания кальция в моче, что обусловлено наличием кальция глюконата в составе препарата.На фоне терапии не рекомендуется употребление алкоголя. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиВо время лечения следует воздержаться от выполнения работ, требующих быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управления автомобилем).

Условия хранения

В сухом месте