Инструкция по применению
Паглюферал-3 Таблетки 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: МОСКОВСКАЯ ФФ
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Бромизовал+Кальция глюконат+Кофеин+Папаверин+Фенобарбитал
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 0.05 г+0.15 г+0.01 г+0.02 г+0.25 г
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Бромизовал+Кальция глюконат+Кофеин+Папаверин+Фенобарбитал

Состав

Действующее вещество: Бромизовал + Кальция глюконат + Кофеин + Папаверин + Фенобарбитал (Bromisovalum + Calcii gluconas + Coffeinum + Papaverinum + Phenobarbitalum)Концентрация действующего вещества (мг): Бромизовал 0,15 г

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Фенобарбитал: всасывается медленно, полностью. Cmax в плазме крови определяется через 1-2 ч, связь с белками плазмы - 50%. Метаболизируется в печени, индуцирует микросомальные ферменты печени CYP3A4, CYP3A5, CYP3A7 (скорость ферментативных реакций возрастает в 10-12 раз). Кумулирует в организме. T1/2 составляет 2-4 суток. Выводится почками в виде глюкуронида, около 25% - в неизмененном виде. Проникает в грудное молоко и через плацентарный барьер. Кофеин: абсорбция хорошая, происходит на всем протяжении кишечника. Cmax в плазме крови достигается через 50-75 мин. Быстро распределяется во всех органах и тканях, проникает через ГЭБ и плаценту. Связь с белками крови (альбуминами) - 25-36%. Метаболизму в печени подвергается более 90%, у детей первых лет жизни - до 10-15%. У взрослых около 80% дозы кофеина метаболизируется и параксантин, около 10% - в теобромин и около 4% - в теофиллин. Эти соединения впоследствии деметилируются в монометилксантины, а затем в метилированные мочевые кислоты. T1/2 у взрослых - 3.9-5.3 ч (иногда до 10 ч). Выведение кофеина и его метаболитов осуществляется почками.Папаверин: биодоступность в среднем - 54%. Связь с белками плазмы - 90%. Хорошо распределяется, проникает через гистогемагические берьеры. Метаболизируется в печени. T1/2 - 0.5-2 ч (может удлиняться до 24 ч). Выводится почками в виде метаболитов.Кальция глюконат: приблизительно 1/5-1/3 часть всасывается в тонком кишечнике. Около 20% выводится почками, остальное количество удаляется с содержимым кишечника (активно выделяется стенкой терминального отдела ЖКТ).

Показания

Эпилепсия.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям с 14 лет - по 2 табл. 2 раза в день. Детям 10–14 лет - по 1 табл. 2 раза в день; 7–9 лет - по 1,5 табл. 2 раза в день.

Противопоказания

Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата;выраженная печеночная и /или почечная недостаточность;лекарственная зависимость (в т.ч. в анамнезе); гиперкинезы;миастения;выраженная анемия;порфирия;сахарный диабет;гипофункция надпочечников;гипертиреоз;депрессия;бронхообструктивные заболевания;активный алкоголизм;беременность;период лактации;детский возраст (до 7 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Со стороны нервной системы: головокружение, общая слабость, атаксия, дизартрия, нистагм, парадоксальная реакция (особенно у пожилых и ослабленных больных - возбуждение), галлюцинации, нарушения сна.Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, запор или диарея, повышение активности печеночных трансаминаз.Со стороны кроветворной системы: агранулоцитоз, мегалобластная анемия, тромбоцитопения.Со стороны сердечно-сосудистой системы: снижение или повышение АД, тахикардия, аритмия (в т.ч. экстрасистолия), AV-блокада.Прочие: аллергические реакции, при длительном применении - лекарственная зависимость.

Передозировка

Симптомы: усиление выраженности побочных эффектов.Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Фенитоин и вальпроаты повышают содержание фенобарбитала в сыворотке крови. Действие фенобарбитала снижается при одновременном приеме с резерпином, увеличивается при сочетании с амитриптилином, ниаламидом, диазепамом, хлордиазепоксидом.Снижает эффективность пероральных контрацептивов и салицилатов.Снижает содержание в крови непрямых антикоагулянтов, ГКС, гризеофульвина, доксициклина, эстрогенов и других лекарственных средств, метаболизирующихся в печени по пути окисления (ускоряет их метаболизм). Усиливает действие этанола, нейролептиков, наркотических анальгетиков, миорелаксантов, седативных и снотворных средств.Ацетазоламид, ощелачивая мочу, снижает реабсорбцию фенобарбитала в почках и ослабляет его эффект.Снижает антибактериальную активность антибиотиков и сульфаниламидов, противогрибковое действие гризеофульвина.

Особые указания

Больным с незначительной гиперкальциурией, снижением клубочковой фильтрации или с нефролитиазом в анамнезе назначение препарата должно проводиться под контролем содержания кальция в моче, что обусловлено наличием кальция глюконата в составе препарата.На фоне терапии не рекомендуется употребление алкоголя. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиВо время лечения следует воздержаться от выполнения работ, требующих быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управления автомобилем).

Условия хранения

В сухом месте