Инструкция по применению
Панадол детский Средство жаропонижающее и болеутоляющее Суспензия со шприцом 120 мг/5 мл 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Суспензия
Страна: Франция
Производитель: Хелеон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Парацетамол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 120 мг/5 мл

Описание

Розовая вязкая жидкость с клубничным запахом, в которой присутствуют кристаллы.

Действующее вещество

Парацетамол

Состав

5 мл суспензии содержат парацетамола 120 мг; вспомогательные вещества: яблочная кислота, ксантановая камедь, мальтитол (гидрогенат сиропа глюкозы), сорбитол, лимонная кислота, нипасепт натрия, ароматизатор клубничный, азорубин, вода.

Форма выпуска

Суспензия

Показания

Применяют у детей в возрасте от 3 мес до 12 лет: для снижения повышенной температуры тела на фоне простудных заболеваний, гриппа и детских инфекционных заболеваний (в т.ч. ветряная оспа, паротит, корь, краснуха, скарлатина); при зубной боли (в т.ч. при прорезывании зубов), головной боли, ушной боли при отите и при боли в горле. У детей 2-3 мес жизни возможен однократный прием для снижения температуры тела после вакцинации.

Способ применения и дозы

Доза препарата зависит от возраста и массы тела ребенка. Детский Панадол суспензия принимают внутрь. Перед употреблением содержимое флакона следует хорошо взболтать. Мерный шприц, вложенный внутрь упаковки, позволяет правильно и рационально дозировать препарат. Детям старше 3 мес. препарат назначают по 15 мг/кг массы тела 3-4 раза в сутки, максимальная суточная доза составляет не более 60 мг/кг массы тела. При необходимости можно принимать препарат каждые 4-6 ч в разовой дозе (15 мг/кг), но не более 4 раз в течение 24 ч.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к парацетамолу или любому другому компоненту препарата; выраженные нарушения функции печени или почек; период новорожденности. С осторожностью следует применять препарат при нарушениях функции печени (в т.ч. синдроме Жильбера), нарушениях функции почек, генетическом отсутствии фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, тяжелых заболеваниях крови (тяжелая анемия, лейкопения, тромбоцитопения).

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: иногда - тошнота, рвота, боли в области желудка. Аллергические реакции: иногда - кожная сыпь, зуд, крапивница, отек Квинке. Со стороны системы кроветворения: редко - анемия, тромбоцитопения, лейкопения. При приеме в рекомендованных дозах парацетамол редко оказывает побочное действие. При появлении побочных реакций следует немедленно прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Особые указания

Детский Панадол нельзя применять с другими парацетамол-содержащими средствами. Детям от 2 до 3 мес и детям, родившимся недоношенными, Детский Панадол можно давать только по назначению врача. При приеме препарата более 7 дней рекомендуется контроль показателей периферической крови и функционального состояния печени.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.