Инструкция по применению
Панавир Гель 3 г

Характеристики



Форма выпуска: Гель
Страна: Россия
Производитель: Панафарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Картофеля побегов сумма полисахаридов*
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0.002 г
Срок годности: 36

Действующее вещество

Картофеля побегов сумма полисахаридов*

Состав

Экстракт побегов картофеля (панавир) 20 мкг.

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

При в/в введении полисахариды определяются в крови уже через 5 мин после введения, захватываются клетками РЭС, печени и селезенки. Через 20-30 мин обнаруживаются в моче и выдыхаемом воздухе.

Показания

Панавир предназначен для лечения инфекций, обусловленных ДНК и РНК вирусами: хроническая рецидивирующая герпетическая инфекция; папилломовирусная инфекция; вирусные дерматозы; клещевой энцефалит.

Способ применения и дозы

Наружно и местно. Гель наносят тонким слоем на пораженные участки кожи и/или слизистых оболочек 5 раз в сутки. Продолжительность лечения - 4–5 дней. Курс лечения может быть продлен до 10 дней.

Противопоказания

индивидуальная непереносимость; больные с тяжелой патологией почек, селезенки; детский возраст;беременность, лактация;Панавир не следует применять больным в случае наличия аллергии к составным компонентам препарата: к глюкозе, маннозе, рамнозе, арабинозе, ксилозе.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью применять при беременности. Противопоказан в период лактации.

Побочные действия

Возможно появление быстро проходящего покраснения и зуда кожи и/или слизистых оболочек на участке нанесения геля.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Диферелин не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата не описано.

Условия хранения

В сухом месте