Инструкция по применению
Панцеф Таблетки покрытые пленочной оболочкой 400 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Македония
Производитель: Alkaloid
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Цефиксим
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 400 мг

Действующее вещество

Цефиксим

Состав

1 Таблетка, покрытая пленочной оболочкой содержит: Действующее вещество: цефиксим (в виде цефиксима тригидрата) - 400—447,630 мг Вспомогательные вещества: МКЦ, крахмал прежелатинизированный, кальция дигидрофосфат, желатин, крахмал кукурузный, натрия лаурилсульфат, магния стеарат, гипромеллоза, макрогол 4000, титана диоксид (E171). Фармакологическое действие Фармакологическое действие - антибактериальное широкого спектра (бактерицидное).

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Всасывание. После приема внутрь всасывание цефиксима составляет 40—50% независимо от приема пищи, однако отмечено, что Cmax в сыворотке крови достигаются быстрее на 0,8 ч при приеме препарата вместе с пищей. При приеме препарата в форме таблеток в дозе 400 мг Cmax в плазме составляет 3,5 мкг/мл. Tmax — 2—6 ч. После приема суспензии Cmax (по сравнению с таблетками) выше на 25—50%. Tmax — 2—6 ч для суспензии 400 мг/5 мл и 2—5 ч для суспензии 200 мг/5 мл. Tmax в плазме крови также составляют 2—6 ч. Распределение. Связывание с белками плазмы составляет 50—60%. Vd составляет 0,6—1,1 л/кг. Высокие концентрации препарата длительно сохраняются в сыворотке крови, желчи, моче. Метаболизм. Нет данных о метаболитах цефиксима. Выведение. Цефиксим выводится в основном почками путем гломерулярной фильтрации в неизмененном виде — 50%, с желчью — 10%. T1/2 у здоровых добровольцев составляет в среднем 3—4 ч, в отдельных случаях — до 9 ч. Продолжительный T1/2 делает возможным однократное дозирование. При нарушении функции почек при Cl креатинина 20—40 мл/мин T1/2 увеличивается и в среднем составляет 6,4 ч, при Cl креатинина 5—20 мл/мин T1/2 — 11,5 ч.

Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к цефиксиму микроорганизмами: инфекции верхних дыхательных путей (тонзиллит, фарингит, синусит) средний отит инфекции нижних дыхательных путей (бронхит, трахеобронхит) инфекции мочевыводящих путей неосложненная гонорея (мочеиспускательного канала и шейки матки).

Способ применения и дозы

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой Внутрь. Для взрослых и детей старше 12 лет массой тела более 50 кг рекомендуемая суточная доза составляет 400 мг (1 раз в сутки или по 200 мг 2 раза в сутки). При неосложненной гонорее — 400 мг однократно. Средняя продолжительность лечения — 7—10 дней. При инфекциях, вызванных Streptococcus pyogenes, курс лечения должен составлять не менее 10 дней. При нарушении функции почек дозу устанавливают в зависимости от показателя клиренса креатинина в сыворотке крови: при Cl креатинина 21—60 мл/мин или у пациентов, находящихся на гемодиализе, суточную дозу следует уменьшить на 25%, при Cl креатинина 20 мл/мин и менее или у пациентов, находящихся на перитонеальном диализе, суточную дозу следует уменьшить в 2 раза.

Противопоказания

повышенная чувствительность к цефалоспоринам, пенициллинам, пеницилламину детский возраст до 6 мес (для суспензии) и до 12 лет (для таблеток). С осторожностью: пожилой возраст, почечная недостаточность, колит (в анамнезе).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение цефиксима при беременности и в период лактации возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При необходимости назначения в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Аллергические реакции: крапивница, гиперемия кожи, кожный зуд, зуд в области половых органов, эозинофилия, лихорадка, мультиформная экссудативная эритема (в т.ч. синдром Стивенса-Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла). Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, шум в ушах. Со стороны мочеполовой системы: вагинит. Со стороны мочевыделительной системы: интерстициальный нефрит. Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, стоматит, диарея, боль в животе, запор, псевдомембранозный энтероколит, дисбактериоз, холестаз, холестатическая желтуха. Со стороны органов кроветворения: панцитопения, лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, апластическая анемия, гемолитическая анемия, кровотечение. Лабораторные показатели: повышение активности печеночных трансаминаз и ЩФ, гипербилирубинемия, повышение азота мочевины, гиперкреатининемия, увеличение ПВ. Прочие: кандидоз, развитие гиповитаминоза В, одышка.

Передозировка

Симптомы: усиление проявлений описанных побочных эффектов. Лечение: промывание желудка, симптоматическая и поддерживающая терапия. Гемодиализ и перитонеальный диализ неэффективны.

Взаимодействие с другими препаратами

Блокаторы канальцевой секреции (аллопуринол, диуретики и др.) задерживают выведение цефиксима почками, что может привести к увеличению токсичности. Цефиксим снижает протромбиновый индекс, усиливает действие непрямых антикоагулянтов. Антациды, содержащие магния или алюминия гидроксид, замедляют всасывание препарата. При одновременном применении цефиксима и карбамазепина увеличивается концентрация последнего.

Особые указания

Пациенты, имевшие в анамнезе аллергические реакции на пенициллины, могут иметь повышенную чувствительность к цефалоспориновым антибиотикам. В случае появления аллергической реакции необходимо прекратить применение препарата и при необходимости принять соответствующие меры. Как и при применении других антибактериальных препаратов, при продолжительном применении цефиксима возможно нарушение нормальной микрофлоры кишечника, что может привести к росту Clostridium difficile, вызвать тяжелую диарею и псевдомембранозный колит. Во время лечения возможна ложноположительная прямая реакция Кумбса и ложноположительная реакция мочи на глюкозу, кетонурию.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре 15—25 °С3 года