Инструкция по применению
Панкрамин Классик Таблетки 40 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Герофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Панкрамин Классик. Биорегулятор поджелудочной железыПри панкреатите, нарушениях функций ЖКТ и сахарном диабете 2 типа.Поджелудочная железа, расположенная позади желудка, имеет длину 15–20 сантиметров, а вес всего 50–70 граммов. Однако важность этого органа в пищеварении и метаболизме организма в целом сложно переоценить. Во-первых, поджелудочная вырабатывает панкреатический сок, состоящий из трех основных ферментов: липаза (помогает расщеплять жиры), амилаза (отвечает за углеводы), химотрипсин и трипсин (расщепляют белки). Во-вторых, поджелудочная железа выделяет инсулин, глюкагон и другие гормоны, которые, поступая в кровь, нормализуют обмен глюкозы. Если эта система выходит из строя, возникает грозное заболевание – диабет. Повреждение клеток поджелудочной железы может быть связано со многими факторами: Инфекционный фактор (вирусы и бактерии), вызывающий воспаление поджелудочной панкреатит, Токсические факторы (например, употребление алкоголя) также разрушающий клетки поджелудочной железы, Длительно существующее повышение уровня глюкозы в крови, Аутоиммунные нарушения и многое другое. Как восстановить клетки поджелудочной при их повреждении? Разумеется, это зависит от механизма и вида повреждения, что требует в каждом конкретном случае специального подхода. Однако можно сказать в целом – почти при всех видах повреждений страдает белковая структура клеток. Это удалось установить благодаря открытию, сделанному в 1999 году Гюнтером Блобелом, который получил за свою научную работу Нобелевскую премию. Ученый выяснил, что белковая молекула является саморегулирующейся. Дефицит белков, пептидов (с возрастом или при

повреждающих факторах) ускоряет износ тканей, процессы старения и приводит к развитию заболеваний.Чтобы клетки восстанавливались и были защищены от повреждения, им в первую очередь нужны протеины. Но каждый вид тканей содержит определенные типы протеинов.Как действует Панкрамин Классик?Компоненты для Панкрамин Классик, получаемые из ферментно-эндокринного сырья, не содержат инсулина и представлены комплексом белков и нуклеопротеидов, обладающих специфическим, избирательным действием на клеточные структуры поджелудочной железы человека. Все дело в том, что комплексы белков и нуклеопротеидов идентичны у всех млекопитающих. Благодаря этому Панкрамин Классик способствует активации восстановительных процессов в ткани железы и нормализует ее пищеварительную и гормональную функции.Как и все цитамины, за счет механизма трансцитоза, Панкрамин Классик действует целенаправленно на клетки поджелудочной железы и способствует нормализации их функции.Благодаря механизму транцитоза поступающий белок в неизмененном виде оказывается в клетке - цели. В данном случае целью являются клетки поджелудочной железы - панкреоциты. Попадая в них, Панкрамин Классик насыщает их оптимальным белковым «рационом», позволяя клеткам быстрее восстанавливаться и нормализовать выполнение своих функций – выделения инсулина и ферментов для нормального пищеварения. Клинические испытания Панкрамин Классик проведены у 125 пациентов с хроническим панкреатитом и латентной формой сахарного диабета 1 типа.В ходе курсового применения Панкрамин Классик у лиц с хроническим панкреатитом повышался аппетит, снижалась частота диспептических расстройств, улучшалось общее самочувствие. Наблюдалось увеличение активности панкреатических ферментов (трипсина и амилазы), что соответствовало положительной клинической динамике.У пациентов с латентной формой сахарного диабета Панкрамин Классик применялся под контролем теста на толерантность к глюкозе, при этом установлено, что на фоне приема Панкрамин Классик происходило постепенное снижение уровня глюкозы в крови с последующей его нормализацией.

Состав

Комплекс полипептидов и нуклеиновых к-от, полученный из поджелудочной железы крупного рогатого скота и свиней - 10мг, сахароза, крахмал картофельный, стеарат кальция, метилцеллюлоза, кишечно-растворимое покрытие

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Рекомендуется для улучшения работы поджелудочной железы, нормализует пищеварение и обменные процессы в организме.Панкрамин Классик показан при различных нарушениях функции поджелудочной железы, таких как: Острый панкреатит Хронический панкреатит Инсулиннезависимый диабет Заболевания желудочно-кишечного тракта с метаболическими нарушениями Пред- и послеоперационный период при операциях на органах желудочно - кишечного тракта, поджелудочной железе и двенадцатиперстной кишке Пожилой возраст (для поддержания нормальной функции пищеварительной системы) Лицам пожилого возраста для поддержания деятельности клеток поджелудочной железы

Способ применения и дозы

Панкрамин Классик рекомендуется принимать по 1-3 таблетки за 10–15 минут до еды 2-3 раза в день в течение 10-15 дней. Повторный курс через 3-6 месяцев. Длительность и периодичность курсов могут быть скорректированы по согласованию с лечащим врачом. Панкрамин Классик не имеет противопоказаний и может использоваться как самостоятельно, так и в рамках комплексной терапии.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.