Инструкция по применению
Панкрамин Таблетки массой 155 мг 40 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: КЛИНИКА ИНСТИТ.БИОРЕГУЛЯЦ. И ГЕРОНТОЛОГИИ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 40
Срок годности: 36



Описание

Панкрамин получен из поджелудочной железы крупного рогатого скота и представляет собой комплекс белков и нуклеопротеидов, обладающих избирательным действием на клеточные структуры поджелудочной железы и способствующих ускорению восстановления, нормализации функций поджелудочной железы. Клинические испытания проведены у 118 больных с хроническим панкреатитом и латентной формой сахарного диабета. Контрольная группа состояла из 96 аналогичных больных, которые находились на традиционном лечении. Критериями оценки эффективности панкрамина служили жалобы больных, а также показатели общеклинических анализов крови и мочи, биохимического исследования крови, исследования дуоденального содержимого, динамика теста на толерантность к глюкозе. По окончании курса применения панкрамина у больных хроническим панкреатитом наблюдалось улучшение аппетита и снижение частоты диспептических расстройств. Объективно отмечалась тенденция к увеличению активности панкреатических ферментов (трипсина и а-амилазы), что коррелировало с улучшением клинической симптоматики. У больных с латентной формой сахарного диабета панкрамин применялся под контролем теста на толерантность к глюкозе. До начала использования панкрамина (после сахарной нагрузки) у больных наблюдалась характерная гликемическая кривая, а на фоне применения панкрамина при постановке теста выявлено постепенное снижение уровня глюкозы в крови с последующей нормализацией. В контрольной группе указанных изменений не выявлено. Особо следует остановиться на вопросе наличия инсулина в панкрамине. В Институте высокомолекулярных соединений РАН было проведено исследование с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии, свидетельствующее об отсутствии следов инсулина в панкрамине. Технология получения полуфабрикатов из поджелудочной железы предусматривает длительное пребывание исходного материала в сильно-щелочной среде, в которой инсулин разрушается.

Состав

Противопоказано при беременности и кормлении грудью.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Нарушение функции поджелудочной железы при остром и хроническом панкреатите, сахарном диабете.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1-3 таблетки 2-3 раза в день, за 10-15 мин. до еды, не разжёвывая. Продолжительность приёма 10-14 дней.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при индивидуальной непереносимости компонентов. Перед применением проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Не выявлено.

Условия хранения

При комнатной температуре