# Инструкция по применению
# Новатенол Крем 5 % 50 г

## Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Хорватия
Производитель: Эгис
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Декспантенол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 5%
Срок годности: 24




## Описание

Однородный крем белого цвета с характерным запахом.

## Действующее вещество

Декспантенол

## Состав

1 г крема содержит: действующее вещество: декспантенол 50 мг, вспомогательные вещества: макрогола цетостеариловый эфир а6, макрогола цетостеариловый эфир а25, цетилстеарил 2-этилгексаноат, цетиловый спирт, диметикон, глицерола моностеарат 40-55 (тип ii), пропиленгликоль, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, ароматизатор, вода очищенная.

## Форма выпуска

Крем

## Фармакокинетика

При местном применении быстро абсорбируется и превращается в пантотеновую кислоту, связывается с белками плазмы (главным образом с бета-глобулином и альбумином).

**Показания**

Повреждения кожи легкой степени, вызванные механическими, химическими, температурными и другими факторами: • царапины, ссадины, • раздражения после воздействия ультрафиолетового (в т.ч. солнечного) и рентгеновского излучения, • ожоги различного происхождения (в т.ч. солнечные), • дерматиты. У детей раннего возраста – для профилактики и лечения пеленочного дерматита легкой степени. У кормящих матерей – для профилактики и лечения трещин сосков молочных желез. Защита кожи от воздействия неблагоприятных климатических факторов (обветривания и обморожения). Профилактика и лечение опрелостей легкой степени у детей и взрослых. Обработка кожи вокруг трахеостом, гастростом и колостом.

**Способ применения и дозы**

Крем применяется местно 2-4 раза в сутки (при необходимости чаще). Наносится тонким слоем на пораженный участок кожи, слегка втирая. В случае нанесения на инфицированную поверхность кожи, ее следует предварительно обработать любым антисептиком. Кормящим матерям смазывать поверхность соска кремом после каждого кормления грудью. Грудным детям наносят крем после каждой смены белья или водной процедуры.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Препарат не имеет противопоказаний при применении во время беременности.

**Побочные действия**

Препарат хорошо переносится. Побочные явления развиваются исключительно редко. Возможны незначительные аллергические реакции.

**Передозировка**

Случаи передозировки не отмечены.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Взаимодействие Д-Пантенола Новатенола крема с другими лекарственными средствами для наружного применения не установлено.

**Условия хранения**

В сухом месте