Инструкция по применению
Новатенол Мазь 5 % 25г

Характеристики



Форма выпуска: Мазь
Страна: Хорватия
Производитель: Эгис
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Декспантенол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 5%
Срок годности: 24

Описание

Однородная мазь светло-желтого цвета с характерным запахом.

Действующее вещество

Декспантенол

Состав

1 г мази содержит: действующее вещество: декспантенол 50 мг, вспомогательные вещества: консервант [феноксиэтанол, метилпарагидроксибензоат, этилпарагидроксибензоат], ланолин, пчелиный воск белый, парафин белый мягкий, диметикон, эмульгатор [цетостеариловый спирт, натрия лаурилсульфат, натрия цетостеарилсульфат], пропиленгликоль, бутилгидроксианизол, бутилгидрокситолуол, декаметилциклопентасилоксан, магния сульфата гептагидрат, основа [воск горный, гидрогенизированное касторовое масло, глицерил моностеарат, масляная кислота, парафин белый мягкий], вода очищенная.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

при местном применении быстро абсорбируется и превращается в пантотеновую кислоту, связывается с белками плазмы (главным образом с бетаглобулином и альбумином).

Показания

• сухость кожи, • раны и ожоги различного происхождения (в т.ч. солнечные), царапины, ссадины, • пролежни, плохо приживающиеся кожные трансплантаты, асептические послеоперационные раны, ,уход за кожей вокруг трахеостом, гастростом и колостом, • дерматиты, фурункулы после вскрытия и санации, трофические язвы нижних конечностей. Лечение и профилактика трещин и воспаления сосков молочной железы во время лактации. Лечение и профилактика последствий неблагоприятного воздействия на кожу факторов внешней среды (холода, ветра, сырости). Уход за грудными детьми: • профилактика и лечение опрелостей у грудных детей, • активизация процесса заживления кожи при мелких повреждениях, пеленочном дерматите, эритеме от пеленок, царапинах и незначительном раздражении после ,воздействия солнца, ультрафиолетового и рентгеновского излучения.

Способ применения и дозы

Наружно. Мазь наносят на поражённый участок кожи 1 или несколько раз в сутки по показаниям. Наносится тонким слоем на пораженный участок кожи, слегка втирая. Кормящим матерям смазывать мазью инфицированную поверхность соска после кормления грудью. Мазь также применяется у детей, в том числе новорожденных. Грудным детям препарат применяют после смены белья или водной процедуры.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

можно применять в период беременности и кормления грудью.

Побочные действия

Побочные явления развиваются исключительно редко. Возможны незначительно выраженные аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки не отмечены.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие Д-Пантенола Новатенола мази с другими лекарственными средствами для наружного применения не установлено.

Условия хранения

В сухом месте