Инструкция по применению
Пантодерм® плюс Крем для наружного применения 5 % + 0,776 % туба 30 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Россия
Производитель: Акрихин
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество:
Декспантенол+Хлоргексидин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 5%+ 0,776%



крем для наружного применения **5 % + 0,776 %** 30 г

Описание

Крем белого или почти белого цвета.

Действующее вещество

Декспантенол+Хлоргексидин

Состав

100 г крема содержат: Активные вещества: декспантенол (D-пантенол) в пересчете на 100 % вещество – 5,000 г хлоргексидина биглюконат, субстанция-раствор 20 % в пересчете на хлоргексидина биглюконат – 0,776 г Вспомогательные вещества: пропиленгликоль – 9,000 г, сквалан – 3,000 г, парафин жидкий – 14,000 г, парафин мягкий белый – 5,000 г, диметикон – 1,000 г, цетостеариловый спирт [цетиловый спирт 60 %, стеариловый спирт 40 %] – 6,700 г, макрогола цетостеарат – 2,300 г, пантолактон – 0,500 г, вода очищенная – до 100 г.

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

При местном применении декспантенол быстро абсорбируется кожей и превращается в пантотеновую кислоту, связывается с белками плазмы (главным образом с бета-глобулином и альбумином). Концентрация ее в крови – 0,5-1 мг/л, в сыворотке крови – 100 мкг/л. Пантотеновая кислота не подвергается в организме метаболизму (кроме включения в кофермент А), выводится в неизмененном виде. Хлоргексидин при местном применении практически не всасывается.

Показания

Лечение: ран с угрозой инфицирования, такие как ссадины, царапины, порезы, расчесы, трещины, ожоги инфицированных поверхностных поражений кожи для обработки послеоперационных ран при хронических ранах, например, трофические язвы голени, пролежни при трещинах и воспалении сосков молочных желез в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Наружно. Препарат наносят тонким слоем на предварительно очищенную раневую поверхность или воспаленный участок кожи один или несколько раз в сутки. Лечение ран может проводиться как открытым способом, так и с использованием повязок. Уход за молочными железами кормящих матерей: крем наносят на соски после каждого кормления.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Для обработки или лечения в области ушной раковины. В случае тяжелых, глубоких или сильно загрязненных ран (такие повреждения требуют врачебного вмешательства).

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат Пантодерм® плюс можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания, избегая нанесения его на большие поверхности кожи.

Побочные действия

Аллергические реакции, такие, как контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, эритема, экзема, сыпь, крапивница, раздражение кожи, анафилактические реакции и анафилактический шок. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Данные о передозировке не предоставлены.

Взаимодействие с другими препаратами

Хлоргексидин не совместим с мылом и другими анионными веществами. В качестве меры предосторожности относительно возможного взаимодействия (антагонизм или инактивация), не следует применять одновременно с другими антисептиками.

Особые указания

Не допускать попадания в глаза. Не допускать попадания на слизистые оболочки. Препарат не следует применять для обработки и лечения ушной раковины. Препарат не применяют для обработки тяжелых, глубоких и сильно загрязненных ран (такие повреждения требуют врачебного вмешательства). Если размеры раны в течение некоторого времени остаются неизменно большими, или рана не заживает в течение 10-14 дней, то в этом случае следует обратиться к врачу. Это необходимо и в случае, если края раны сильно гиперемированы, рана неожиданно отекает и появляются сильные боли или повреждение сопровождается лихорадкой.

Условия хранения

При температуре не выше 25 оС. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.