
Инструкция по применению
Пантодерм® Мазь для наружного применения 5 % туба 30 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Акрихин
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Декспантенол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 5%
Срок годности: 24



Описание

Мазь от белого с желтоватым оттенком до светло-желтого цвета, со специфическим запахом.

Действующее вещество

Декспантенол

Состав

100 г мази содержат: действующее вещество: декспантенол в пересчете на 100 % вещество – 5 г вспомогательные вещества: вазелин, парафин жидкий, миндаля масло, воск пчелиный белый, ланолин, цетостеариловый спирт [цетостеариловый спирт 60 %, стеариловый спирт 40 %], ланолиновый спирт, вода очищенная.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

При местном применении быстро абсорбируется кожей и превращается в пантотеновую кислоту, связывается с белками плазмы (главным образом с бета-глобулином и альбумином). Концентрация ее в крови – 0,5-1 мг/л, в сыворотке крови – 100 мкг/л. Пантотеновая кислота не подвергается в организме метаболизму (кроме включения в Ко-А), выводится в неизмененном виде.

Показания

Сухость кожи лечение поврежденной кожи: мелкие повреждения, ожоги (в т.ч. солнечные), ссадины, буллезный дерматит, абсцесс, фурункул, трофические язвы голени, пролежни, трещины, асептические послеоперационные раны, плохо приживающиеся кожные трансплантаты лечение и профилактика трещин и воспалений сосков молочной железы в период лактации лечение и профилактика опрелости у грудных детей.

Способ применения и дозы

Наружно. Мазь наносят на поврежденный или воспаленный участок кожи один или несколько раз в сутки. Уход за молочными железами кормящих матерей: мазь наносят на соски после каждого кормления можно использовать в виде компресса. Уход за грудными детьми: мазь наносят при каждой смене подгузника (пеленки).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат Пантодерм® можно применять при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки не отмечены.

Взаимодействие с другими препаратами

Данных о взаимодействии препарата с другими лекарственными средствами нет.

Условия хранения

В сухом месте