Инструкция по применению
Пантогам Таблетки 500 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: ПИК-Фарма
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гопантеновая кислота
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 500 мг



Действующее вещество

Гопантеновая кислота

Состав

Активное вещество: кальция гопантенат (Пантогам) 500 мг, Вспомогательные вещества: метилцеллюлоза, кальция стеарат, магния гидроксикарбонат, тальк.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приема внутрь быстро всасывается в ЖКТ. Tmax - 1 ч. Наибольшие концентрации создаются в печени, почках, в стенке желудка и коже. Проникает через ГЭБ. Не метаболизируется. Выводится в неизмененном виде в течение 48 ч: 67.5% от принятой дозы - с мочой, 28.5% - с калом.

Показания

Дети с перинатальной энцефалопатией с первых дней жизни.Различные формы детского церебрального паралича.Умственная отсталость различной степени выраженности, в том числе с поведенческими нарушениями.Нарушения психологического статуса у детей в виде общей задержки психического развития, специфических расстройств речи, двигательных функций и их сочетания, формирования школьных навыков (чтения,письма, счета и др.).Гиперкинетические расстройства, в том числе синдром гиперактивности с дефицитом внимания. Неврозоподобные состояния (при заикании, преимущественно клонической форме, тиках, неорганическом энкопрезе и энурезе).Снижение мнестико-интеллектуальной продуктивности вследствие артериосклеротических изменений сосудов головного мозга, при начальных формах сенильной деменции, органических поражениях головного мозга травматического, токсического, нейроинфекционногогенеза. Шизофрения с церебральной органической недостаточностью (вкомплексе с психотропными препаратами).Экстрапирамидные нарушения при органических заболеваниях мозга (миоклонус-эпилепсия, хорея Гентингтона, гепатолентикулярная дегенерация, болезнь Паркинсона и др.), а также для лечения и профилактики экстрапирамидного синдрома, вызванного приемом нейролептиков.Эпилепсия с замедленностью психических процессов и снижением когнитивной продуктивности совместно с антиконвульсантами. Психоэмоциональные перегрузки, снижение умственной и физической работоспособности, для улучшения концентрации внимания и запоминания. Нейрогенные расстройства мочеиспускания (поллакиурия, императивные позывы, императивное недержание мочи).

Способ применения и дозы

Взрослым: разовая доза - 0,25–1 г, суточная - 1,5–3 г; детям: разовая доза - 0,25–0,5 г, суточная - 0,75–3 г . Курс лечения - 1–4 мес, в отдельных случаях - до 6 мес. Через 3–6 мес возможно проведение повторного курса лечения. При эпилепсии в комбинации с противосудорожными средствами - 0,75–1 г/сут. Курс лечения - до 1 года и более. При экстрапирамидном нейролептическом синдроме в комбинации с проводимой терапией суточная доза - до 3 г, лечение в течение нескольких месяцев. При экстрапирамидных гиперкинезах у больных с наследственными заболеваниями нервной системы (комбинированное лечение) - 0,5–3 г/сут. Курс лечения - до 4 мес и более. При последствиях нейроинфекций и ЧМТ - по 0,25 г 3–4 раза в сутки. Для восстановления работоспособности при повышенных нагрузках и астенических состояниях - по 0,25 г 3 раза в сутки. Для лечения экстрапирамидного синдрома, вызванного приемом нейролептиков, взрослым - по 0,5–1 г 3 раза в день; детям - по 0,25–0,5 г 3–4 раза в день. Курс лечения - 1–3 месяца. При тиках: детям - по 0,25–0,5 г 3–6 раз в день, в течение 1–4 месяца. При нарушениях мочеиспускания: взрослым - по 0,5–1 г 2–3 раза в сутки; детям - по 0,25–0,5 г (суточная доза - 25–50 мг/кг). Курс лечения - 1–3 месяца. Детям с различной патологией нервной системы, в зависимости от возраста, препарат рекомендуется в дозе 1–3 г. Тактика назначения препарата: наращивание дозы в течение 7–12 дней, прием в максимальной дозе на протяжении 15–40 дней и постепенное снижение дозы до отмены Пантогама в течение 7–8 дней. Перерыв между курсовыми приемами Пантогама, как и для любого другого ноотропного средства, составляет от 1 до 3 месяца.

Противопоказания

Гиперчувствительность. Острые тяжелые заболевания почек. Беременность (i триместр сироп). Беременность (таблетки). Фенилкетонурия (сироп, содержит аспартам). Период грудного вскармливания (таблетки). Детский возраст до 3 лет (таблетки).

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение в I триместре беременности.

Побочные действия

Аллергические реакции возможны ринит, конъюнктивит, кожные высыпания.Прочие возможны нарушения сна или сонливость, шум в ушах (данные симптомы обычно кратковременны и не требуют отмены препарата).

Взаимодействие с другими препаратами

Удлиняет действие барбитуратов, усиливает эффекты противосудорожных средств, ноотропных и средств, стимулирующих ЦНС, действие местных анестетиков (прокаина). Предотвращает побочные явления фенобарбитала, карбамазепина, антипсихотических средств (нейролептиков). Действие гопантеновой кислоты усиливается в сочетании с глицином, ксидифоном.

Особые указания

Не рекомендуется длительная терапия гопантеновой кислотой в сочетании с другими ноотропными и стимулирующими ЦНС средствами.