Инструкция по применению
Пантокальцин Таблетки 500 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Валента Фарм
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гопантеновая кислота
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 500 мг
Срок годности: 4



Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого цвета с фаской и риской для дозировки 500 мг, с фаской и крестообразной риской для дозировки 250 мг.

Действующее вещество

Гопантеновая кислота

Состав

1 таблетка содержит: действующее вещество: гопантеновая кислота - 250,00 мг или 500,00 мг вспомогательные вещества: магния гидроксикарбонат, кальция стеарат, тальк, крахмал картофельный.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Фармакокинетика Быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте. Время достижения максимальной концентрации в плазме крови составляет 1 ч. Наибольшие концентрации создаются в печени, почках, в стенке желудка, коже. Проникает через гематоэнцефалический барьер. Не метаболизируется. Выводится в неизмененном виде в течение 48 ч (67,5% от принятой дозы - с мочой, 28,5% - с калом).

Показания

когнитивные нарушения при органических поражениях головного мозга и невротических расстрой-ствах в составе комплексной терапии цереброваскулярной недостаточности, вызванной атеросклеротиче-скими изменениями сосудов головного мозга сенильной деменции (начальной формы), резидуальных органических поражений мозга у лиц зрелого возраста и пожилых церебральная органическая недостаточность у больных шизофренией (в комбинации с нейролепти-ками, антидепрессантами) экстрапирамидные гиперкинезы у больных с наследственными заболеваниями нервной системы (хорея Гентингтона, гепатоцеребральная дистрофия, болезнь Паркинсона и др.) последствия перенесенных нейроинфекций и черепно-мозговых травм (в составе комплексной терапии) для коррекции побочного действия нейролептиков и с профилактической целью одновременно как терапия прикрытия экстрапирамидный нейролептический синдром (гиперкинетический и акинетиче-ский) эпилепсия с замедлением психических процессов (в комбинации с противосудорожными препарата-ми). психоэмоциональные перегрузки, снижение умственной и физической работоспособности для улучшения концентрации внимания и запоминания расстройства мочеиспускания: энурез, дневное недержание мочи, поллакиурия, императивные позывы детям при умственной отсталости (задержка психического, речевого, моторного развития или их сочетания) детском церебральном параличе заикании (преимущественно клоническая форма) эпилепсии (в составе комбинированной терапии с противосудорожными препаратами, особенно при полиморфных приступах и малых эпилептических припадках). "

Способ применения и дозы

Внутрь, через 15-30 минут после еды. Разовая доза для взрослых составляет 0,5-1 г, для детей - 0,25-0,5 г, суточная доза для взрослых - 1,5-3 г, для детей - 0,75-3 г. Длительность курса лечения - от 1 до 4 месяцев, в отдельных случаях до 6 месяцев. Через 3-6 месяцев возможно проведение повторного курса лечения. Детям при умственной недостаточности: по 0,5 г 4-6 раз в день, ежедневно в течение 3 месяцев, при задержке речевого развития - по 0,5 г 3-4 раза в день в течение 2-3 месяцев. При нейролептическом синдроме (в качестве корректора побочного действия нейролептических средств): взрослым по 0,5-1 г 3 раза в день, детям - 0,25-0,5 г 3-4 раза в день. Длительность курса лечения -1-3 месяца. При эпилепсии: детям по 0,25-0,5 г 3-4 раза в день, взрослым по 0,5-1 г 3-4 раза в день ежедневно в течение длительного времени (до 6 месяцев). При гиперкинезах (тиках): детям по 0,25-0,5 г 3-6 раз в день ежедневно в течение 1-4 месяцев, взрослым - по 1,5-3 г в день ежедневно в течение 1-5 месяцев. При расстройствах мочеиспускания: взрослым по 0,5-1 г 2-3 раза в день (суточная доза 2-3 г), детям - по 0,25-0,5 г (суточная доза 25-50 мг/кг). Длительность курса лечения - от 2 недель до 3 месяцев (зависит от выраженности расстройств и терапевтического эффекта). При последствиях нейроинфекций и черепно-мозговых травм: по 0,25 г 3-4 раза в день. Для восстановления работоспособности при повышенных нагрузках и астенических состояниях: по 0,25 г 3 раза в день. Данная лекарственная форма не рекомендована детям до 3-х лет.

Противопоказания

Гиперчувствительность острая почечная недостаточность беременность (1 триместр).

Побочные действия

Возможны аллергические реакции: ринит, конъюнктивит, кожные высыпания.

Взаимодействие с другими препаратами

Пролонгирует действие барбитуратов усиливает эффекты препаратов, стимулирующих центральную нервную систему, противосудорожных лекарственных средств, действие местных анестетиков (прокаи-на). Предотвращает побочное действие фенобарбитала, карбамазепина, антипсихотических средств (нейролептиков). Действие гопантеновой кислоты усиливается в сочетании с глицином, ксидифоном.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении