Инструкция по применению
Эвалар Пантокрин Пантея экстракт для приема внутрь 50 мл

Характеристики



Форма выпуска: Жидкость
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Пантов благородного оленя экстракт
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачная жидкость светло-желтого цвета.При хранении допускается появление осадка, исчезающего при нагревании на водяной бане до температуры (45-50) °С. Раствор остается прозрачным после охлаждения до комнатной температуры.

Действующее вещество

Пантов благородного оленя экстракт

Состав

Активное вещество: панты оленя благородного (панты марала) - 120 г.
Вспомогательные вещества: уксусная кислота - 2,74 г, этанол (спирт этиловый) 50 % - достаточное количество для получения 1000 мл препарата.

Форма выпуска

Жидкость

Показания

Переутомление неврастения астенические состояния после острых инфекционных заболеваний артериальная гипотензия (в составе комплексной терапии), в качестве тонизирующего и стимулирующего средства при повышенных физических и умственных нагрузках.

Способ применения и дозы

Внутрь: по 25-40 капель за 30 минут до еды 2-3 раза в день в течение 3-4 недель. Повторные курсы лечения возможны через 5-7 дней после консультации с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата артериальная гипертензия выраженный атеросклероз стенокардия органические заболевания сердца повышенная возбудимость расстройства сна повышенная свертываемость крови тяжелые формы нефрита диарея злокачественные новообразования. Препарат не рекомендуется применять в возрасте до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции редко - тахикардия нарушения сна головная боль повышение артериального давления.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат не следует назначать с антикоагулянтами.

Особые указания

Препарат не следует принимать во второй половине дня во избежание нарушений сна. Лицам имеющим хронические заболевания перед применением препарата следует обязательно проконсультироваться с врачом.Максимальная разовая доза препарата (40 капель/2 мл) содержит 08 г абсолютного этилового спирта. Максимальная суточная доза препарата (120 капель/6 мл) содержит 24 г абсолютного этилового спирта.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период лечения препаратом необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.