Инструкция по применению
Пантокрин Таблетки 30 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Пантов благородного оленя экстракт
Количество в упаковке: 30

Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, белого с сероватым или с желтоватым оттенком цвета. Допускаются вкрапления сероватого и желтоватого цвета.

Действующее вещество

Пантов благородного оленя экстракт

Состав

Пантов благородного оленя экстракт. Вспомогательные вещества: Лактозы моногидрат – 0,113 г, Крахмал картофельный - 0,028 г, Тальк – 0,004 г, Кальция стеарат - 0,001 г, Масса таблетки - 0,300 г.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания

Переутомление; неврастения; неврозы; астенические состояния после острых инфекционных заболеваний; артериальная гипотензия (в составе комплексной терапии); в качестве тонизирующего и стимулирующего средства при повышенных физических и умственных нагрузках.

Способ применения и дозы

Внутрь, в первой половине дня по 1-2 таблетки через 30 минут после еды 2-3 раза в день. Курс лечения – 3-4 недели. Повторные курсы лечения возможны по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление); выраженный атеросклероз; хроническая сердечная недостаточность; органические заболевания сердца; стенокардия; повышенная возбудимость; нарушение сна; повышенная свертываемость крови; тяжелые заболевания печени; тяжелые формы нефрита; диарея; злокачественные новообразования; дефицит лактазы; непереносимость лактозы; глюкозо-галактозная мальабсорбция; беременность; период грудного вскармливания; возраст до 18 лет. С осторожностью Функциональные нарушения печени; сахарный диабет. Лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов. Если у вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, редко (более 1/10000 и менее 1/1000) – тахикардия, нарушение сна, головная боль, повышение артериального давления. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Не следует назначать с антикоагулянтами, солями кальция и лекарственными средствами, стимулирующими перистальтику кишечника.

Особые указания

Во избежание нарушений сна не следует принимать препарат во второй половине дня. Больным сахарным диабетом необходимо учитывать, что в одной таблетке содержится около 0,141 г углеводов (0,012 ХЕ). Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом, в защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.