Инструкция по применению
Пантовигар капсулы 90 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Германия
Производитель: Merz Pharma
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Прочие препараты
Количество в упаковке: 90



Описание

Твердые желатиновые капсулы: крышечка капсулы — темно-зеленого цвета, корпус цвета слоновой кости. Содержимое капсулы бежево-коричневатый порошок с характерным запахом.

Действующее вещество

Поливитамины+Прочие препараты

Состав

1 капсула содержит:Действующие вещества:Дрожжи медицинские 100 мгТиамина мононитрат 60 мгКальция пантотенат 60 мгЦистин 20 мгпара-Аминобензойная кислота 20 мгКератин 20 мгВспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, тальк, магния стеарат, повидон, кремния диоксид коллоидный. Оболочка капсулы: желатин, вода очищенная, титана диоксид, краситель железа оксид желтый,индиготин.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Исследований фармакокинетики препарата не проводили. Витамины препарата всасываются в верхних отделах желудочнокишечного тракта. Компоненты аминокислот, полученные в результате гидролиза кератина (цистина и парааминобензойной кислоты), всасываются путем пассивной диффузии и/или при участии определенных транспортных систем.

Показания

Диффузное выпадение волос негормональной этиологии.Дегенеративные изменения структуры волос (вследствие химического воздействия, повреждения волос солнечным и ультрафиолетовым излучением).Нарушение структуры ногтей.

Способ применения и дозы

Взрослые: 3 раза в день по 1 капсуле внутрь, во время еды, не разжевывая с небольшим количеством жидкости.Средняя продолжительность лечения составляет 3-6 месяцев. По необходимости лечение может быть продолжено или повторено.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременным и кормящим женщинам препарат назначается врачом в случае, когда польза для матери превышает риск для плода или ребенка.

Побочные действия

Побочные реакции классифицируются по частоте встречаемости следующим образом: очень часто (⩾ 1/10), часто (⩾ 1/100 до Нарушения со стороны нервной системы: частота неизвестна: головная боль и головокружение.Нарушения со стороны сердца: редко: тахикардия, учащение пульса, частота неизвестна: сердцебиение.Желудочно-кишечные нарушения: частота неизвестна: диарея, рвота, боль в животе, метеоризм, изжога, тошнота.Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: редко: крапивница, сыпь, зуд, частота неизвестна: покраснение.Общие нарушения и реакции в месте введения: редко: повышенное потоотделение.

Передозировка

Симптомов передозировки не наблюдалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Если Вы одновременно принимаете сульфаниламидные препараты, Вы должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом, можно ли Вам принимать Пантовигар и как его принимать.

Особые указания

Инфекционные заболевания ногтей и андрогенное облысение не являются показаниями к применению препарата. При данных патологиях препарат может использоваться в составе комбинированной терапии.Так как формирование волос это длительный процесс, важно принимать препарат в указанных дозировках регулярно в течение 3-6 месяцев. Если заболевания волос или ногтей принимают неблагоприятное, сильно прогрессирующее течение, необходимо обратиться к врачу, так как эти заболевания могут быть признаками общих заболеваний.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не оказывает или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Условия хранения

При температуре не выше 25°С, в сухом, защищенном от света месте.Хранить в недоступном для детей месте.