Инструкция по применению
Панум таблетки 40 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Индия
Производитель: Юник
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Пантопразол
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 40 мг
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Пантопразол

Состав

1 таблетка содержит: Активное вещество: пантопразола натрия сесквигидрат 45.1 мг, что соответствует содержанию пантопразола 40 мг;Вспомогательные вещества: кросповидон, кальция стеарат, маннитол, повидон, натрия карбонат безводный, натрия гидроксид, симетиконовая эмульсия (30%), краситель Opadry YS-1R-7006 прозрачный (гипромеллоза 5сП, макрогол 400, макрогол 6000), краситель Opadry акрилез желтый 93О92052 (метакриловой кислоты сополимер (тип С), тальк, титана диоксид, триэтилцитрат, кремния диоксид коллоидный, натрия гидрокарбонат, железа оксид желтый, натрия лаурилсульфат).

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Показания

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в фазе обострения), в т.ч. ассоциированная с Helicobacter pylori; - эрозивный гастрит; - гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; - рефлюкс-эзофагит; - синдром Золлингера-Эллисона; - стрессовые язвы ЖКТ

Способ применения и дозы

Применяется внутрь. Таблетка не разжевывается, запивается небольшим количеством жидкости.;При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни суточная доза составляет 40 мг однократно, возможно увеличение дозы до 80 мг/сут. Продолжительность курса лечения при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки - 14 дней (иногда препарат применяется дополнительно еще в течение 2 недель), при язвенной болезни желудка и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни - 4 недели (в отдельных случаях препарат применяется еще в течение 4 недель).;При комбинированной эрадикационной антихеликобактерной терапии у больных язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки препарат назначается по 40 мг 2 раза/сут (перед завтраком и перед ужином или во время еды) в сочетании с амоксициллином, азитромицином, кларитромицином, метронидазолом. Продолжительность эрадикационной терапии - 7 дней (максимально - 2 недели).

Противопоказания

- диспепсия невротического генеза; - злокачественные заболевания ЖКТ; - тяжелая печеночная недостаточность; - повышенная чувствительность к компонентам препарата.;

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат может применяться при беременности только по строгим показаниям, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода.;При назначении препарата в период лактации необходимо решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Побочные действия

Со стороны органов пищеварительной системы: диарея; редко - сухость во рту, повышенный аппетит, тошнота, отрыжка, рвота, метеоризм, боль в животе, запор, повышение активности трансаминаз.;Со стороны ЦНС и органов чувств: головная боль; редко -астения, головокружение, сонливость, бессонница; в отдельных случаях - нервозность, депрессия, тремор, парестезии, фотофобия, нарушения зрения, шум в ушах.;Со стороны мочеполовой системы: в единичных случаях - гематурия, отеки, импотенция.;Со стороны кожных покровов: в единичных случаях - алопеция, акне, эксфолиативный дерматит.;Аллергические реакции: редко - сыпь, крапивница, зуд, ангионевротический отек.;Прочие: редко - гипергликемия, миалгия; в единичных случаях - лихорадка, эозинофилия, гиперлипопротеинемия, гиперхолестеринемия.

Передозировка

Симптомы передозировки пантопразола не описаны.

Взаимодействие с другими препаратами

Пантопразол снижает эффект лекарственных средств, всасывающихся при кислых значениях pH (в т.ч. кетоконазола).;Не влияет на фармакокинетические параметры препаратов, метаболизирующихся при участии ферментной системы цитохрома P450, таких как феназепам, диазепам, дигоксин, теофиллин, карбамазепин, диклофенак, напроксен, пироксикам, фенитоин, варфарин, нифедипин, метопролол, этанол.;Не влияет на эффективность гормональных контрацептивов.

Особые указания

Перед началом лечения должны быть исключены злокачественные заболевания пищевода и желудка (симптоматическое улучшение может отсрочить правильную диагностику и лечение).;Диагноз гастроэзофагеальной рефлюксной болезни должен быть подтвержден эндоскопически.;У пожилых больных и при нарушении функции почек не рекомендуется превышать дозу 40 мг/сут.;При тяжелой печеночной недостаточности режим дозирования должен быть скорректирован: по 40 мг 1 раз в 2 дня, под контролем уровня печеночных ферментов (при их повышении показана отмена препарата).

Условия хранения

В прохладном темном месте