Инструкция по применению
Папаверина гидрохлорид Таблетки 40 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Папаверин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 40 мг
Срок годности: 60.0

Описание

Папаверин - спазмолитическое средство. Выпускается в форме таблеток (40 мг). Препарат снижает тонус гладких мышц, оказывает сосудорасширяющее и спазмолитическое действие. В больших дозах снижает возбудимость сердечной мышцы и замедляет внутрисердечную проводимость. Действие на центральную нервную систему выражено слабо. Применяется при спазмах гладких мышц: органов брюшной полости (холецистит, пилороспазм, спастический колит), почечной колике, спазмах сосудов головного мозга, периферических сосудов (эндартериит), сердца (стенокардия – в составе комплексной терапии), бронхоспазмах. Отпускается без рецепта.

Действующее вещество

Папаверин

Состав

Папаверина гидрохлорид - 40 мг Вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 149,8 мг, стеариновая кислота - 2,7 мг, сахароза (сахар-песок) - 157,5 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Абсорбция - высокая. Биодоступность в среднем – 54 %. Связь с белками плазмы – 90 %. Хорошо распределяется в тканях, проникает через гистогематические барьеры. Метаболизируется в печени. Период полувыведения – 0,5-2 часа. Выводится почками в виде метаболитов. Полностью удаляется из крови при гемодиализе.

Показания

Спазм гладких мышц: органов брюшной полости (холецистит, пилороспазм, спастический колит), почечная колика, периферических сосудов (эндартериит), сосудов головного мозга, сердца (стенокардия – в составе комплексной терапии), бронхоспазм.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым по 40-60 мг 3-4 раза в сутки. Высшая разовая доза – 200 мг, суточная – 600 мг. Детям старше 10 лет по 20 мг 3-4 раза в сутки. Детям младше 10 лет рекомендуется прием детских форм препарата.

Противопоказания

гиперчувствительность к папаверину и другим компонентам препарата, атриовентрикулярная блокада, глаукома, тяжелая почечная недостаточность, дефицит сахарозы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, угнетение дыхания, коматозное состояние, пожилой возраст (риск развития гипертермии), детский возраст до 10 лет (для данной лекарственной формы).

Применение при беременности и кормлении грудью

Безопасность применения препарата при беременности и в период грудного вскармливания не установлена. При беременности и в период грудного вскармливания применение препарата возможно только в том случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Побочные действия

Аллергические реакции, атриовентрикулярная блокада, желудочковая экстрасистолия, снижение артериального давления, запор, сонливость, повышение активности «печеночных» трансаминаз, эозинофилия.

Передозировка

Симптомы: диплопия, слабость, снижение артериального давления, сонливость.
Лечение: симптоматическое (поддержание артериального давления).

Взаимодействие с другими препаратами

Папаверин снижает противопаркинсонический эффект леводопы и гипотензивный эффект метилдопы. В комбинации с барбитуратами спазмолитическое действие папаверина усиливается. При совместном применении с трициклическими антидепрессантами, прокаинамидом, резерпином, хинидином возможно усиление гипотензивного эффекта папаверина.

Особые указания

В период лечения прием этанола должен быть исключен. Вазодилатирующее действие снижается при табакокурении. При назначении Папаверина больным сахарным диабетом следует учитывать, что в качестве вспомогательных веществ в таблетке содержится сахароза.

Условия хранения

В сухом месте