Инструкция по применению
Папаверина гидрохлорид Вифитех Таблетки 40 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Папаверин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 40 мг
Срок годности: 2.0

Описание

Спазмолитическое средство

Действующее вещество

Папаверин

Состав

Состав на одну таблетку: Папаверина гидрохлорид - 40 мг Вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 149,8 мг, стеариновая кислота - 2,7 мг, сахароза (сахар-песок) - 157,5 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Абсорбция - высокая. Биодоступность в среднем - 54 %. Связь с белками плазмы - 90%. Хорошо распределяется в тканях, проникает через гистогематические барьеры. Метаболизируется в печени. Период полувыведения - 0,5-2 часа. Выводится почками в виде метаболитов. Полностью удаляется из крови при гемодиализе.

Показания

Спазм гладких мышц: органов брюшной полости (холецистит, пилороспазм, спастический колит), почечная колика, периферических сосудов (эндартериит), сосудов головного мозга, сердца (стенокардия - в составе комплексной терапии), бронхоспазм.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым по 40-60 мг 3-4 раза в сутки. Высшая разовая доза - 200 мг, суточная - 600 мг. Детям старше 10 лет по 20 мг 3-4 раза в сутки. Детям младше 10 лет рекомендуется прием детских форм препарата.

Противопоказания

Гиперчувствительность, атриовентрикулярная блокада, глаукома, тяжелая печеночная недостаточность, пожилой возраст (риск развития гипертермии), детский возраст до 10 лет (для данной лекарственной формы). С осторожностью: Состояния после черепномозговой травмы, хроническая почечная недостаточность, недостаточность функции надпочечников, гипотиреоз, гиперплазия предстательной железы, наджелудочковая тахикардия, шоковые состояния, беременность, период лактации (безопасность не установлена).

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности и в период лактации (грудного вскармливания) безопасность и эффективность папаверина не установлена.

Побочные действия

Аллергические реакции, атриовентрикулярная блокада, желудочковая экстрасистолия, снижение артериального давления, запор, сонливость, повышение активности печеночных трансаминаз, эозинофилия.

Взаимодействие с другими препаратами

Папаверин снижает противопаркинсонический эффект леводопы и гипотензивный эффект метидцопы. В комбинации с барбитуратами спазмолитическое действие папаверина усиливается. При совместном применении с трициклическими антидепрессантами, прокаинамидом, резерпином, хинидином возможно усиление гипотензивного эффекта папаверина.

Особые указания

В период лечения прием этанола должен быть исключен. Вазодилатирующее действие папаверина снижается при табакокурении. При назначении Папаверина больным сахарным диабетом следует учитывать, что в качестве вспомогательных веществ в таблетке содержится сахароза.

Условия хранения

Беречь от детей, При комнатной температуре.