Инструкция по применению
Папазол Таблетки 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Дальхимфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бендазол+Папаверин
Количество в упаковке: 10

Описание

Комбинированный препарат, оказывает спазмолитическое, гипотензивное, вазодилатирующее действие.

Действующее вещество

Бендазол+Папаверин

Состав

Папаверина гидрохлорид, бендазола гидрохлорид.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

артериальная гипертензия (лабильная),спазм периферических артерий и сосудов головного мозга,спазм гладкой мускулатуры внутренних органов (в т.ч. язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, спазм привратника, кишечная колика, холецистит, спастический колит),полиомиелит (остаточные явления),периферический паралич лицевого нерва.

Способ применения и дозы

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования.

Противопоказания

нарушения AV-проводимости,эпилептический синдром,бронхообструктивный синдром, детский возраст до 1 года,повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, запор.Со стороны ЦНС: головокружение.Со стороны сердечно-сосудистой системы: AV-блокада, аритмии, снижение сократимости миокарда.Прочие: аллергические реакции, повышенное потоотделение.