Инструкция по применению
Папазол Таблетки 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бендазол+Папаверин
Количество в упаковке: 20



Описание

Таблетки белого или белого с сероватым оттенком цвета, плоскоцилиндрические, с фаской. Допускается наличие едва заметных вкраплений.Спазмолитическое средство.

Действующее вещество

Бендазол+Папаверин

Состав

Состав на одну таблетку:действующие вещества: бендазола гидрохлорид (дибазол) - 30 мг, папаверина гидрохлорид - 30 мг,вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 56 мг, тальк - 3 мг, кислота стеариновая - 1 мг

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Бендазол – биодоступность 80 %, продуктами биотрансформации бендазола в крови являются два конъюгата, образующиеся вследствие метилирования и карбоэтоксилирования иминогруппы имидазольного кольца бендазола: 1-метил-2-бензилбензимидазол и 1-карбоэтокси-2-бензилбензимидазол. Метаболиты бендазола выводятся с мочой. Папаверина гидрохлорид – биодоступность в среднем – 54 %. Связь с белками плазмы – 90 %. Хорошо распределяется, проникает через гистогематические барьеры. Метаболизируется в печени. Период полувыведения – 0,5 – 2 часа (может удлиняться до 24 часов). выводится почками в виде метаболитов. Полностью удаляется из крови при гемодиализе.

Показания

Применяют при спазмах периферических сосудов и сосудов головного мозга, при спазмах гладкой мускулатуры органов брюшной полости.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет: по 1 - 2 таблетки 2 - 3 раза в сутки. Детям от 3-х до 12 лет: по 1 таблетки 2 - 3 раза в сутки. Режим дозирования определяется лечащим врачом. Курс лечения индивидуальный, обычно 2 – 4 недели. Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Гиперчувствительность к бендазолу или папаверину и/или любому вспомогательному веществу в составе препарата, нарушения атриовентрикулярной проводимости, эпилептический синдром, бронхообструктивный синдром, угнетение дыхания, детский возраст до 3 лет. Если у Вас есть одно из перечисленных выше заболеваний /состояний или факторов риска перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Безопасность применения препарата при беременности и в период грудного вскармливания не установлена. При беременности и в период грудного вскармливания применение препарата возможно только в том случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Перед применением препарата Папазол, если Вы беременны или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом. В период грудного вскармливания перед применением препарата Папазол необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Для оценки частоты нежелательных реакций (НР) использованы следующие критерии: «часто» (> 1/100, < 1/10), «нечасто» (> 1/1000, < 1/100), «редко» (> 1 /10000, < 1/1000), «очень редко» (< 1/10000), «частота неизвестна» (невозможно оценить на основании имеющихся данных). НР сгруппированы в соответствии с системно-органными классами медицинского словаря для нормативно-правовой деятельности MedDRA, а также рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.Для препарата ПапазолДо настоящего времени не сообщалось о побочных эффектах при приеме данной комбинации. Частота возникновения нижеперечисленных возможных побочных эффектов неизвестна. Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции. Нарушения со стороны нервной системы: головокружение, сонливость. Нарушения со стороны сердца: развитие атриовентрикулярной блокады, нарушение сердечного ритма, снижение сократимости миокарда. Желудочно-кишечные нарушения: тошнота, рвота, запор. Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: повышенная потливость.Для бендазолаПеречисленные эффекты проявляются при применении в больших дозах. При снижении дозы или отмене препарата названные побочные явления быстро проходят. Нарушения со стороны нервной системы: частота неизвестна - головокружение, головная боль. Желудочно-кишечные нарушения: частота неизвестна - тошнота. Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: частота неизвестна - повышенная потливость. Для папаверина гидрохлорида Нарушения со стороны крови и лимфатической системы: очень редко - эозинофилия. Нарушения со стороны нервной системы: часто - сонливость.Нарушения со стороны сердца: нечасто - желудочковая экстрасистолия. Нарушения со стороны сосудов: часто - снижение артериального давления. Желудочно-кишечные нарушения: часто - тошнота, запор, нечасто - повышение активности «печеночных» трансаминаз. Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто - кожная сыпь (обычно эритематозная, крапивница), нечасто - кожный зуд, редко - повышенная потливость. Важно сообщать о развитии нежелательных реакций с целью обеспечения непрерывного мониторинга отношения пользы и риска лекарственного препарата. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу. Медицинские работники сообщают о нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях.

Передозировка

Для препарата Папазол: Симптомы передозировки препарата обусловлены свойствами входящих в него компонентов. При передозировке возникает чувство жара, повышенная потливость, диплопия, слабость, сонливость, тошнота, головокружение, гипотензия, головная боль. Лечение: специфического антидота не существует. Отмена препарата, промывание желудка, назначение активированного угля и проведение симптоматической терапии. Для бендазола: сведения о случаях передозировки отсутствуют. Наиболее вероятным нежелательным явлением может быть выраженное снижение артериального давления. Лечение: при выраженном снижении артериального давления придать пациенту положение «лежа» с приподнятыми нижними конечностями, проводить симптоматическую терапию. Для папаверина гидрохлорида: симптомы передозировки - диплопия (двоение в глазах), слабость, снижение артериального давления. Лечение: симптоматическое (поддержание артериального давления). При появлении симптомов передозировки следует прекратить прием препарата и немедленно обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Фармакодинамическое взаимодействие: при одновременном применении со спазмолитиками, седативными средствами, диуретиками, трициклическими антидепрессантами, прокаинамидом, резерпином, хинидином возможно усиление гипотензивного эффекта. Ослабляет действие антихолинэстеразных препаратов (галантамин, прозерин, физиостигмин и других) на гладкую мускулатуру, уменьшает антипаркинсонический эффект леводопы. Фармакокинетическое взаимодействие: адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства уменьшают всасывание препарата в желудочно-кишечном тракте. Бендазол: предупреждает обусловленное бета-адреноблокаторами увеличение общего периферического сосудистого сопротивления. Фентоламин усиливает гипотензивное действие бендазола. Папаверина гидрохлорид: снижает противопаркинсонический эффект леводопы и гипотензивный эффект метилдопы. В комбинации с барбитуратами спазмолитическое действие папаверина усиливается. При совместном применении с трициклическими антидепрессантами, прокаинамидом, резерпином, хинидином возможно усиление гипотензивного эффекта папаверина. В сочетании с алпростадилом усиливается риск развития приапизма. Если Вы применяете выше перечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Папазол проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

В период лечения должен быть исключен прием алкоголя. Не превышать максимальные сроки и рекомендованные дозы при самостоятельном применении препарата. В случае отсутствия уменьшения или при утяжелении симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.5 лет. Не применять по истечении срока годности.