Инструкция по применению
Париет таблетки 10 мг 7 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Швейцария
Производитель: Johnson & Johnson
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Рабепразол
Количество в упаковке: 7
Дозировка действующего вещества: 10 мг



Действующее вещество

Рабепразол

Состав

Рабепразол (rabeprazole) 10 мг

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Язвенная болезнь желудка в стади обострения и язва анастомоза . язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в стадии обострения . эрозивная гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь или рефлюкс-эзофагит . поддерживающая терапия гастроэзофагеальной рефлюксной болезни . неэрозивная гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь . синдром Золлингера-Эллисона и другие состояния, характеризующиеся патологической гиперсекрецией . в комбинации с соответствующей антибактериальной терапией для эрадикации Helicobacter pylori у пациентов с язвенной болезнью.

Способ применения и дозы

Таблетки препарата Париет следует проглатывать целиком, не разжевывая и не измельчая. Установлено, что ни время суток, ни прием пищи не влияют на активность рабепразола натрия.

Противопоказания

Беременность . период лактации . детский возраст до 12 лет . гиперчувствительность к рабепразолу, замещенным бензимидазолам или к вспомогательным компонентам препарата. С осторожностью применять у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью тяжелой степени, в детском возрасте.

Применение при беременности и кормлении грудью

Данных по безопасности применения рабепразола во время беременности нет. Исследования репродуктивности на крысах и кроликах не выявили признаков нарушения фертильности или дефектов развития плода, обусловленных рабепразолом . однако у крыс в небольших количествах препарат проникает через плацентарный барьер. Париет не следует применять при беременности за исключением случаев, когда ожидаемый положительный эффект для матери превосходит возможный вред для плода. Неизвестно, выделяется ли рабепразол с грудным молоком. Соответствующие исследования у кормящих женщин не проводились. Вместе с тем рабепразол обнаружен в молоке актирующих крыс, и поэтому Париет нельзя назначать кормящим женщинам.

Побочные действия

Острые системные аллергические реакции . тромбоцитопения, нейтропения, лейкопения . гипомагниемия . повышение активности печеночных ферментов,гепатит, желтуха, печеночная энцефалопатия . интерстициальный нефрит . буллезные высыпания, крапивница,мультиформная эритема, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона. миалгия, артралгия, гинекомастия.

Особые указания

Острые системные аллергические реакции . тромбоцитопения, нейтропения, лейкопения . гипомагниемия . повышение активности печеночных ферментов,гепатит, желтуха, печеночная энцефалопатия . интерстициальный нефрит . буллезные высыпания, крапивница,мультиформная эритема, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона. миалгия, артралгия, гинекомастия.