Инструкция по применению
Пауэркорт Крем 0,05 % 15 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Индия
Производитель: Glenmark Pharmaceuticals
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Клобетазол
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0



Описание

Крем Пауэркорт - противовоспалительное и противоаллергическое средство. Обладает глюкокортикоидной активностью, более выраженной, чем у природных гормонов. Применяется местно (устраняет отек, гиперемию, зуд в месте нанесения).

Действующее вещество

Клобетазол

Состав

Клобетазола пропионат 500 мкг.Вспомогательные вещества: парафин белый мягкий, парафин жидкий, цетомакрогол, натрия фосфат моногидрат, натрия фосфат дигидрат, бутилгидрокситолуол, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, пропиленгликоль, вода очищенная.

Форма выпуска

Крем

Показания

Псориаз (кроме пустулезного и распространенного бляшечного), хроническая экзема, плоский лишай, дискоидная красная волчанка, другие кожные болезни при неэффективности других кортикостероидов.

Способ применения и дозы

Крем наносятся тонким слоем на пораженную кожу 1-2 до получения эффекта. Лечение нельзя проводить более 4 недель без оценки необходимости его продолжения. Для лечения обострений кожных заболеваний можно проводить повторные короткие курсы Пауэркортом. Если необходимо продолжение терапии ГКС, следует использовать менее активные препараты. В особо резистентных случаях, особенно при наличии гиперкератоза, противовоспалительный эффект крема Пауэркорт может быть усилен с помощью наложения на ночь на область применения препарата повязки из полиэтиленовой пленки, что обычно сопровождается положительным эффектом. В дальнейшем достигнутый эффект удается поддерживать без применения окклюзионной повязки.

Противопоказания

— розовые угри — вульгарные угри — рак кожи — узловая почесуха Гайда — периоральный дерматит — перианальный и генитальный зуд — бактериальные, вирусные и грибковые заболевания кожи (простой герпес, ветряная оспа, туберкулез кожи, актиномикоз) — распространенный бляшечный и пустулезный псориаз — возраст до 1 года — период лактации — повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

ГКС для местного применения не следует применять при беременности длительное время в больших дозах.Безопасность применения клобетазола пропионата в период лактации не установлена.

Побочные действия

Длительное назначение ГКС для местного применения в больших дозах или нанесение их на обширные участки кожи может сопровождаться системной абсорбцией с последующим развитием симптомов гиперкортицизма. Риск развития данного осложнения повышен у детей, особенно при применении окклюзионной повязки, при этом пеленка может выполнять роль такой повязки.При условии назначения Пауэркорта взрослым пациентам в дозировке не более 50 г в неделю, подавление функции гипофиза и надпочечников имеет транзиторный характер с быстрым их восстановлением сразу после окончания курса лечения.Длительное лечение высокоактивными ГКС для местного применения в больших дозах может вызвать атрофические изменения кожи, в частности, ее истончение, появление атрофических полос (стрий), расширение поверхностных кровеносных сосудов, особенно при наложении окклюзионных повязок и при нанесении препарата на участки кожи со складками. Могут развиться пигментация кожи и гипертрихоз. В редких случаях лечение псориаза ГКС для местного применения (или их отмена) провоцирует развитие пустулезного псориаза.Иногда Пауэркорт может вызвать обострение симптомов заболевания.

Передозировка

Развитие острой передозировки маловероятно. Однако, в случае хронической передозировки или неправильного применения могут развиться симптомы гиперкортицизма, что требует постепенной отмены препарата под наблюдением врача.

Особые указания

Противопоказания - гиперчувствительность, угри розовые и юношеские, периоральный дерматит, бактериальные, вирусные и грибковые инфекции кожи, генитальный и перианальный зуд, беременность и кормление грудью, детский возраст (до 1 года).

Условия хранения

В сухом месте