Инструкция по применению
Пектрол Таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой 40 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: КРКА
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Изосорбида мононитрат
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 40 мг



Действующее вещество

Изосорбида мононитрат

Состав

1 таблетка содержит изосорбида-5-мононитрат 40 и 60 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приема внутрь изосорбид-5-мононитрат быстро и полностью абсорбируется из ЖКТ. Биодоступность составляет 90-100%. Концентрация в плазме прямо пропорциональна дозе. Изосорбид-5-мононитрат почти полностью биотрансформируется в печени с образованием неактивных метаболитов. Выводится почками преимущественно в виде метаболитов, 2% - в неизмененном виде. T1/2 составляет 4-5 ч.

Показания

Профилактика приступов стенокардии у больных с ИБС.хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной терапии).

Способ применения и дозы

Пектрол принимаютВнутрь, после еды, проглатывая целиком и запивая стаканом воды. Обычная начальная доза - 40 мг 1 раз в сутки (утром). Дозу препарата можно увеличить до 60 мг 1 раз в сутки или до 80 мг (по 40 мг 2 раза в сутки).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к нитратам или другим компонентам Пектрола. артериальная гипотензия и гиповолемия (сАД

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно в случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Побочные действия

Со стороны сердечно-сосудистой системы «нитратная» головная боль, головокружение, преходящая гиперемия кожи лица, ощущение жара, тахикардия, выраженное снижение АД. В редких случаях - усиление приступов стенокардии (парадоксальная реакция), ортостатический коллапс.Со стороны ЖКТ тошнота, рвота, возможно появление ощущения легкого жжения языка, сухость во рту.Со стороны ЦНС скованность, сонливость, нечеткость зрения, снижение способности к быстрым психическим и двигательным реакциям (особенно в начале лечения). В редких случаях - ишемия головного мозга.Аллергические реакции кожная сыпь, в отдельных случаях - эксфолиативный дерматит.Прочие развитие толерантности (в т.ч. перекрестной к другим нитратам).

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с адсорбентами, вяжущими и обволакивающими средствами уменьшается абсорбция изосорбида мононитрата. При одновременном применении с антихолинергическими средствами возможны нарушения памяти и внимания у пациентов пожилого возраста. При одновременном применении вазодилататоров, блокаторов кальциевых каналов, трициклических антидепрессантов, этанола возможно усиление гипотензивного эффекта. При одновременном применении с антигипертензивными препаратами, бета-адреноблокаторами, нейролептиками, ингибиторами ФДЭ возможно усиление гипотензивного эффекта. При одновременном применении с дигидроэрготамином возможно увеличение концентрации и усиление действия дигидроэрготамина. При одновременном применении с норадреналином терапевтическое действие норадреналина уменьшается. При одновременном применении с силденафилом возникает риск развития тяжелой артериальной гипотензии и инфаркта миокарда.

Особые указания

Не применяют для купирования приступов стенокардии. С осторожностью применяют при повышенном внутричерепном давлении. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами: В период лечения не рекомендуется водить транспортные средства и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими быстрых психомоторных реакций.