Инструкция по применению
Пектусин Таблетки для рассасывания 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Татхимфармпрепараты
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Эвкалипта прутовидного листьев масло+[Левоментол]
Количество в упаковке: 20



Описание

Таблетки белого цвета плоскоцилиндрической формы с фаской и риской, со слабым специфическим запахом.

Действующее вещество

Эвкалипта прутовидного листьев масло+[Левоментол]

Состав

1 таблетка содержит: Активные вещества: левоментола - 0.0020 г, мяты перечной листьев масла в пересчете на 100 % левоментол - 0,0020 г, эвкалиптового масла - 0,0005 г. Вспомогательные вещества: сахарозы (сахар-рафинад) - 0.7571 г, кармеллоза натрия -0,0120 г, кремния диоксида коллоидного (аэросил) - 0,0078 г. талька - 0.0139 г. магния стеарата - 0,0047 г.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат применяют в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.

Способ применения и дозы

Таблетки следует держать во рту до полного рассасывания, не разжевывая. Взрослым - по 1 таблетке 3-4 раза в день, детям старше 8 лет - по 1-2 таблетке в день. Длительность лечения 5 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, дефицит сахаразы /изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, детский возраст до 8 лет.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не отмечалось

Взаимодействие с другими препаратами

не описано

Особые указания

В одной таблетке содержится 0,7571 г сахарозы, что соответствует 0,06 ХЕВлияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:

Условия хранения

В сухом месте, при температуре не выше 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте.