Инструкция по применению
Пенталгин Таблетки покрытые пленочной оболочкой 4 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки покрытые пленочной оболочкой
Страна: Россия
Производитель: Отисифарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Дротаверин+Кофеин+Напроксен+Парацетамол+Фенирамина малеат
Количество в упаковке: 4
Дозировка действующего вещества: 325 мг+ 100 мг+ 50 мг+ 40 мг+ 10 мг



Действующее вещество

Дротаверин+Кофеин+Напроксен+Парацетамол+Фенирамина малеат

Состав

Парацетамол 325 мг напроксен 100 мг кофеин 50 мг дротаверина гидрохлорид 40 мг фенирамина малеат 10 мг Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 128 мг, крахмал картофельный - 55.38 мг, кроскармеллоза натрия - 32 мг, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) - 32.52 мг, лимонной кислоты моногидрат - 3 мг, бутилгидрокситолуол (Е321) - 0.3 мг, магния стеарат - 7.2 мг, тальк - 16.12 мг, краситель хинолиновый желтый (Е104) - 0.4608 мг, индигокармин (Е132) - 0.0192 мг. Состав оболочки: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) - 12.17 мг, повидон (поливинилпирролидон среднемолекулярный медицинский, повидон К25) - 3.87 мг, полисорбат 80 (твин 80) - 1.1 мг, титана диоксид - 3.43 мг, тальк - 4.218 мг, краситель хинолиновый желтый (Е104) - 0.2 мг, индигокармин (Е132) - 0.0127 мг, или Оболочка Опадрай 13А210001 Зеленый (OPADRY 13A210001 GREEN) - 25.0007 мг [гипромеллоза - 12.17 мг, повидон - 3.87 мг, полисорбат 80 - 1.1 мг, титана диоксид - 3.43 мг, тальк - 4.218 мг, хинолиновый желтый - 0.2 мг, DF&C голубой #2/ индигокармин - 0.0127 мг].

Форма выпуска

Таблетки покрытые пленочной оболочкой

Показания

слабо и умеренно выраженный болевой синдром различного генеза (в т. ч. боли в суставах, мышцах, радикулит, альгодисменорея, невралгия, головная боль, мигрень, зубная боль) . лихорадочные состояния, простудные и другие заболевания, сопровождающиеся болевым синдромом и воспалением.

Способ применения и дозы

Пенталгин принимают внутрь по 1 таблетке 1-3 раза в день. Максимальная суточная доза – 4 таблетки. Длительность лечения не более 3 дней в качестве жаропонижающего средства и не более 5 дней - в качестве обезболивающего. Продолжение лечения препаратом возможно только после консультации с врачом.

Противопоказания

тяжелая печеночная недостаточность . почечная недостаточность тяжелой степени . язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения . бронхиальная астма . бронхоспазм . анемия, лейкопения . состояния, сопровождающиеся угнетением дыхания . черепно-мозговая травма . артериальная гипертензия тяжелой степени . острый инфаркт миокарда . аритмии . алкогольное опьянение . глаукома . дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы . детский возраст до 12 лет . повышенная чувствительность к компонентам препарата. С осторожностью следует применять препарат при артериальной гипертензии легкой и средней степени тяжести, язвенной болезни желудка и/или двенадцатиперстной кишки в фазе ремиссии, а также у пациентов пожилого возраста.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности. При необходимости применения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек . Со стороны органов кроветворения: тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз, анемия, метгемоглобинемия . Со стороны нервной системы: возбуждение, тревожность, усиление рефлексов, тремор, головная боль, нарушения сна, головокружение, снижение концентрации внимания . Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердцебиение, аритмии, повышение артериального давления . Со стороны пищеварительной системы: эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, тошнота, рвота, дискомфорт в эпигастрии, боли в животе, запор, нарушение функции печени . Со стороны мочевыделительной системы: нарушение функции почек . Со стороны органов чувств: снижение слуха, шум в ушах, повышение внутриглазного давления у пациентов с закрытоугольной глаукомой . Прочие: дерматит, тахипноэ (учащение дыхания).

Особые указания

Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек . Со стороны органов кроветворения: тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз, анемия, метгемоглобинемия . Со стороны нервной системы: возбуждение, тревожность, усиление рефлексов, тремор, головная боль, нарушения сна, головокружение, снижение концентрации внимания . Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердцебиение, аритмии, повышение артериального давления . Со стороны пищеварительной системы: эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, тошнота, рвота, дискомфорт в эпигастрии, боли в животе, запор, нарушение функции печени . Со стороны мочевыделительной системы: нарушение функции почек . Со стороны органов чувств: снижение слуха, шум в ушах, повышение внутриглазного давления у пациентов с закрытоугольной глаукомой . Прочие: дерматит, тахипноэ (учащение дыхания).