
**Инструкция по применению**
**Пентовит Таблетки 100 шт**




### Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Алтайвитамины
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Никотинамид+Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+Фолиевая кислота
Количество в упаковке: 1

### Описание

Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой белого цвета.

### Действующее вещество

Никотинамид+Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+Фолиевая кислота

### Состав

Состав на одну таблетку: Действующие вещества: Тиамина гидрохлорид (витамин B1) - 10 мг Пиридоксина гидрохлорид (витамин B6) - 5 мг Никотинамид - 20 мг Фолиевая кислота - 0,4 мг Цианокобаламин (витамин B 12) - 0,05 мг Вспомогательные вещества для получения таблетки-ядра массой 0,20 г: Сахароза - 111,000 мг Кроскармеллоза натрия (примеллоза) - 8,000 мг Тальк - 3,000 мг Кальция стеарат - 2,000 мг Крахмал картофельный - 40,550 мг Вспомогательные вещества для получения оболочки массой 0,14 г: Сахароза - 67,50 мг Воск пчелиный - 0,17 мг Тальк - 0,10 мг Магния карбонат основной - 25,67 мг Мука пшеничная - 37,44 мг Метилцеллюлоза - 0,67 мг Желатин - 0,36 мг Парафин жидкий (вазелиновое масло) - 0,17 мг Титана диоксид - 7,92 мг Масса таблетки: - 0,340 г

### Форма выпуска

Таблетки

**Показания**

Комплексная терапия заболеваний периферической (радикулит, невралгии, невриты) и центральной нервной системы, астенические состояния разного генеза.

**Способ применения и дозы**

Внутрь, по 2-4 таблетки 3 раза в день (после еды). Курс лечения - 3-4 недели. Повторные курсы по рекомендации врача.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст (эффективность и безопасность применения не исследованы). Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозогалактозная мальабсорбция.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Применение препарата Пентовит при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

**Побочные действия**

Аллергические реакции к компонентам препарата (зуд, крапивница), тошнота, тахикардия.

**Передозировка**

В настоящее время о случаях передозировки препарата не сообщалось.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Витамин B6, входящий в данный комплекс, снижает противопаркинсоническую активность леводопы. Алкоголь резко снижает всасывание витамина B1.

**Особые указания**

Не превышать рекомендованную суточную дозу. Не рекомендуется одновременный прием поливитаминных комплексом, включающих в состав витамины группы B. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не влияет на способность управлять автотранспортом и потенциально опасными механизмами.

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 оС. Хранить в недоступном для детей месте.