Инструкция по применению
Перекись водорода 3% Раствор для местного и наружного применения 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Южфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Водорода пероксид
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 3%

Описание

Бесцветная прозрачная жидкость без запаха.

Действующее вещество

Водорода пероксид

Состав

Активное вещество: Перекись водорода медицинская - от 7,5 до 11 г в зависимости от фактического содержания водорода пероксида в исходной субстанции эквивалентно содержанию водорода пероксида - 3 г (от 30 до 40 %) Вспомогательные вещества: Натрия бензоат - 0,05 г Вода очищенная - до 100 мл

Форма выпуска

Раствор

Показания

Воспалительные заболевания слизистых оболочек, гнойные раны, капиллярное кровотечение из поверхностных ран, носовые кровотечения. Для дезинфекции и дезодорирования: стоматит, ангина, тонзиллит, гинекологические заболевания.

Способ применения и дозы

Для наружного применения используют 1-3 % раствор, для полоскания полости рта и горла, нанесения на слизистые оболочки - 0,25 % раствор (3% раствор разводят водой в соотношении 1:11). Поврежденные участки кожи или слизистой оболочки обрабатывают ватным или марлевым тампоном, смоченным раствором препарата. Тампоны следует держать пинцетом. Возможно струйное орошение раневой поверхности.

Противопоказания

гиперчувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат не имеет противопоказаний для применения во время беременности и в период лактации.

Побочные действия

Жжение в момент обработки раны, аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы: раздражение верхних дыхательных путей (ожог, ларинго- бронхоспазм), при попадании внутрь - раздражение слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, гемолиз, гемоглобинурия, летальная доза - около 3 г. Лечение: промывание желудка 0,5 % раствором натрия тиосульфата, растворами натрия гидрокарбоната, внутривенно натрия тиосульфат 30 % - до 300 мл.

Взаимодействие с другими препаратами

Раствор перекиси водорода нестабилен в щелочной среде, в присутствии солей металлов, сложных радикалов некоторых оксидантов, а также на свету и в тепле.

Особые указания

Не рекомендуется использовать препарат под окклюзионные повязки. Следует избегать попадания в глаза! Не применять для орошения полостей! Обработка раны раствором перекиси водорода не гарантирует от заражения столбняком и др. раневой инфекцией. 3 % раствор применяют внутрь в токсикологической практике в качестве антидота (в комбинации с 3 % раствором уксусной кислоты) при отравлении калия перманганатом.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Не влияет.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 0 С. Хранить в недоступном для детей месте.