Инструкция по применению
Периндоприл Медисорб Таблетки 4 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Медисорб
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Периндоприл
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 4 мг



Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого или почти белого цвета с фаской и риской. Таблетку можно разделить на равные дозы.

Действующее вещество

Периндоприл

Состав

Препарат Периндоприл Медисорб содержит Действующим веществом является периндоприл. Периндоприл Медисорб, 4 мг, таблетки Каждая таблетка содержит 4 мг периндоприла эрбумина. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются лактозы моногидрат, кремния диоксид коллоидный (аэросил) (А-380), целлюлоза микрокристаллическая (тип 200), магния стеарат. Препарат Периндоприл Медисорб содержит лактозы моногидрат (см. раздел 2).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Периндоприл Медисорб показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет. Артериальная гипертензия. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН). Профилактика повторного инсульта (комбинированная терапия с индапамидом) у пациентов, перенёсших инсульт или транзиторное нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу. Стабильная ишемическая болезнь сердца (ИБС): снижение риска развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов со стабильной ИБС.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Рекомендуемая доза: Принимайте препарат Периндоприл Медисорб 1 раз в сутки. Подходящую Вам дозу препарата Периндоприл Медисорб будет определять лечащий врач, исходя из Вашего заболевания, возраста и функции почек, а также Вашей реакции на препарат, которая определяется по изменению артериального давления. В некоторых случаях, например, если у Вас снижен объём циркулирующей крови или концентрации электролитов, наблюдается декомпенсация хронической сердечной недостаточности, нарушена функция почек или если Вы в пожилом возрасте, стартовая доза периндоприла должна составлять 2 мг 1 раз в сутки. Артериальная гипертензия Рекомендуемая начальная доза составляет 4 мг 1 раз в сутки. При необходимости через месяц после начала терапии врач может увеличить дозу препарата до 8 мг 1 раз в сутки. Сердечная недостаточность Лечение ХСН препаратом Периндоприл Медисорб в комбинации с другими препаратами (диуретиками, дигоксином, бета-адреноблокаторами) начинают под тщательным медицинским наблюдением, назначая препарат в начальной дозе 2 мг 1 раз в сутки утром. Через 2 недели лечения доза препарата может быть повышена врачом до 4 мг 1 раз в сутки, при условии хорошей переносимости дозы 2 мг и удовлетворительного ответа на проводимую терапию. Профилактика повторного инсульта (совместная терапия с индапамидом) Лечение начинают, назначая препарат в начальной дозе 2 мг 1 раз в сутки в течение 2 недель. Через 2 недели лечения доза препарата может быть повышена врачом до 4 мг 1 раз в сутки в течение последующих 2 недель до применения индапамида. Лечение можно начинать в любое время (от 2 недель до нескольких лет) после перенесённого инсульта. ИБС: снижение риска сердечно-сосудистых осложнений у пациентов, ранее перенёсших инфаркт миокарда и/или коронарную реваскуляризацию Если у Вас стабильное течение ишемической болезни сердца, лечение препаратом Периндоприл Медисорб начинают с дозы 4 мг 1 раз в сутки. Через 2 недели при хорошей переносимости препарата и с учётом состояния функции почек врач может увеличить дозу до 8 мг 1 раз в сутки. Путь и (или) способ введения Внутрь, утром, перед приёмом пищи, запивая стаканом воды. При необходимости таблетки препарата Периндоприл Медисорб 4 мг и 8 мг можно разделить на равные дозы по риске. Продолжительность терапии Продолжительность лечения определяет лечащий врач. Если Вы считаете, что эффект препарата слишком сильный или слишком слабый, проконсультируйтесь у лечащего врача.

Противопоказания

Не принимайте препарат Периндоприл Медисорб: если у Вас аллергия на периндоприл, другие ингибиторы АПФ или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша), если у Вас в прошлом возникал отёк лица, верхних и нижних конечностей, губ, слизистых оболочек, языка, голосовых складок и/или гортани (ангионевротический отёк (отёк Квинке)), связанный с приёмом ингибиторов АПФ, если у Вас имеется наследственный / с неизвестной причиной (идиопатический) ангионевротический отёк, если Вы беременны или кормите грудью, если у Вас сахарный диабет и/или умеренные или тяжёлые нарушения функции почек (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 2 площади поверхности тела) и Вы принимаете алискирен и лекарственные препараты, содержащие алискирен, если у Вас заболевание почек, связанное с сахарным диабетом (диабетическая нефропатия) и Вы применяете антагонисты рецепторов ангиотензина II (АРА II), если Вы применяете комбинированные лекарственные препараты, содержащие валсартан + сакубитрил, если Вы проходите диализ или другой тип фильтрации крови, если у Вас сужены сосуды, приносящие кровь к почкам (выраженный двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной функционирующей почки). Если Вы считаете, что любое из перечисленного относится к Вам, сообщите об этом Вашему лечащему врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Беременность Применение препарата Периндоприл Медисорб противопоказано во время беременности. Применение ингибиторов АПФ (таких как периндоприл) во втором и третьем триместрах беременности может привести к нарушениям развития плода (снижение функции почек, маловодие, задержка окостенения черепа, повышенное артериальное давление, повышенный уровень калия в крови). Если беременность наступила во время лечения препаратом Периндоприл Медисорб, обратитесь к лечащему врачу. В подобных ситуациях врач посоветует Вам прекратить приём препарата и подберёт другой препарат, более подходящий Вам. Грудное вскармливание Применение препарата Периндоприл Медисорб противопоказано в период грудного вскармливания. Если Вы собираетесь кормить ребёнка грудным молоком, обратитесь к лечащему врачу, чтобы он подобрал Вам другой препарат, более подходящий Вам. Не установлено влияния на репродуктивную функцию или фертильность.

Побочные действия

Нежелательные реакции при приёме Периндоприл Медисорб Препарат может вызывать нежелательные реакции, но они возникают не у всех. Срочно прекратите приём и обратитесь за помощью при: Нечасто (⩽ 1 из 100): бронхоспазм (затруднение дыхания) ангионевротический отёк (затруднённое дыхание/глотание с отёком лица, губ, языка или горла). Очень редко (⩽ 1 из 10 000): признаки острой почечной недостаточности (снижение мочи, АД, отёки рук и ног) агранулоцитоз (снижение гранулоцитов) панцитопения (снижение всех форменных элементов крови) стенокардия или инфаркт миокарда (резкая боль в груди, потливость, слабость) инсульт (слабость в руках/ногах, проблемы с речью или мимикой) эозинофильная пневмония (нарушение дыхания, кашель, ночная потливость, температура) панкреатит (боль в животе, тошнота, рвота, нарушения пищеварения) гепатит (расстройства пищеварения, слабость, тошнота, боль/тяжесть в правом боку, желтуха, потемнение мочи, осветление кала) мультиформная эритема (красные зудящие пятна на лице, руках или ногах). Другие возможные НЯ Часто (⩽ 1 из 10): головокружение головная боль парестезия (жжение, покалывание, «мурашки») вертиго (головокружение с ощущением вращения) нарушения зрения звон в ушах артериальная гипотензия (избыточное снижение АД) кашель одышка боль в животе запор диарея дисгевзия (извращение вкуса) диспепсия тошнота рвота кожный зуд кожная сыпь мышечные спазмы астения (непреходящая усталость). Нечасто (⩽ 1 из 100): эозинофилия гипогликемия гиперкалиемия гипонатриемия лабильность настроения нарушение сна сонливость обморок ощущение сердцебиения тахикардия васкулит сухость во рту крапивница реакции фоточувствительности пемфигоид повышенное потоотделение артралгия миалгия почечная недостаточность эректильная дисфункция боль в грудной клетке недомогание периферические отёки лихорадка повышение мочевины в крови повышение креатинина в крови потеря равновесия/падение. Редко (⩽ 1 из 1 000): обострение псориаза повышение билирубина в крови повышение активности печёночных ферментов. Очень редко (⩽ 1 из 10 000): лейкопения нейтропения (риск инфекций) гемолитическая анемия (у пациентов с недостаточностью глюкозо-5-фосфатдегидрогеназы) тромбоцитопения снижение гемоглобина /гематокрита СНСАДГ (потемнение мочи, тошнота/рвота, мышечные спазмы, спутанность сознания, судороги) спутанность сознания аритмия ринит. Частота неизвестна: синдром Рейно (бледность, онемение, боль в пальцах рук и ног). Сообщение о НЯ При любых нежелательных реакциях проконсультируйтесь с врачом. Вы также можете сообщить о НЯ напрямую — это помогает улучшить данные о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы приняли препарата Периндоприл Медисорб больше, чем следовало Если Вы приняли больше назначенной дозы, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если возможно, возьмите таблетки или коробку с препаратом с собой, чтобы показать врачу. Наиболее вероятным эффектом в случае передозировки является понижение артериального давления, из-за чего Вы можете почувствовать головокружение или потерять сознание. Если это случилось, лягте на спину и поднимите ноги, это может облегчить Ваше состояние. Также симптомы, связанные с передозировкой ингибиторами АПФ, могут включать опасное для жизни состояние нарушения кровообращения, приводящее к неспособности организма поддерживать доставку крови в ткани организма и удовлетворять потребности в кислороде (циркуляторный шок), нарушения водно-электролитного баланса (изменение содержания солей в организме), нарушение функции почек, учащённое поверхностное дыхание, учащённое сердцебиение, ощущение сердцебиения, замедленное сердцебиение, головокружение, беспокойство и кашель. Если Вы забыли принять препарат Периндоприл Медисорб Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Обязательно сообщите врачу, если Вы принимаете любой из нижеперечисленных препаратов: другие лекарственные препараты для лечения повышенного артериального давления, включая ингибиторы АПФ, АРА II, алискирен (см. также Противопоказания), диуретики (препараты, увеличивающие объем мочи, выделяемой почками), калийсберегающие препараты (такие как триамтерен, амилорид, эплеренон, спиронолактон), пищевые добавки с калием или заменители солей, содержащие калий, и другие лекарственные препараты, которые могут увеличить содержание калия в организме (такие как гепарин и ко-тримоксазол, также известный как комбинированный лекарственный препарат, содержащий сульфаметоксазол + триметоприм), калийнесберегающие диуретики (например, фуросемид), препараты лития (применяются при мании или депрессии), нестероидные противовоспалительные лекарственные препараты (например, ибупрофен), ингибиторы циклооксигеназы-2 (например, вальдекоксиб, эторикоксиб) для снятия боли или ацетилсалициловую кислоту (аспирин) в высоких дозах (3000 мг в сутки и более), препараты для лечения сахарного диабета, такие как инсулин, метформин или глиптины (линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин), баклофен (применяется при лечении ригидности мышц при таких

заболеваниях как рассеянный склероз), препараты для лечения психических нарушений — депрессии, тревоги, шизофрении и др. (например, трициклические антидепрессанты, антипсихотические средства), иммунодепрессанты, которые используются для лечения аутоиммунных нарушений или после трансплантационных операций для предупреждения отторжения (например, циклоспорин, такролимус), триметоприм (для лечения инфекций), эстрамустин (применяется при лечении онкологических заболеваний), препараты, которые наиболее часто используются для лечения диареи (рацекадотрил) или для профилактики отторжения трансплантированных органов (сиролимус, эверолимус, темсиролимус и другие препараты, принадлежащие к классу так называемых ингибиторов mTOR), комбинация валсартана и сакубитрила, которая применяется для лечения хронической сердечной недостаточности (см. Противопоказания) аллопуринол (для лечения подагры), прокаинамид (для лечения нерегулярного сердечного ритма), сосудорасширяющие препараты, включая нитраты (препараты, вызывающие расширение кровеносных сосудов), препараты, которые используются для лечения пониженного артериального давления, шока или астмы (например, эфедрин, норадреналин или адреналин), препараты золота для внутривенного введения (применяются при лечении симптомов ревматоидного артрита), рекомбинантные тканевые активаторы плазминогена (rtPA, алтеплаза): препараты, используемые для растворения сгустков крови при опасных для жизни сердечно-сосудистых заболеваниях, таких как ишемический инсульт. В некоторых случаях применение перечисленных препаратов вместе с препаратом Периндоприл Медисорб противопоказано (см. Противопоказания) или требует особых мер предосторожности (см. Особые указания и меры предосторожности).

Особые указания

Важные предупреждения при приёме Периндоприл Медисорб Стабильная ишемическая болезнь сердца При боли в груди (возможный признак стенокардии или инфаркта) — немедленно обратитесь за медпомощью. Сообщите врачу о эпизодах стенокардии — может потребоваться смена препарата. Артериальная гипотензия Возможны головокружение, падения из-за резкого снижения АД. При симптомах — лечь на спину, приподняв ноги. Если симптомы усиливаются — обратитесь к врачу (может потребоваться снижение дозы или замена препарата). Нарушение функции почек Сообщите врачу о любых заболеваниях почек в анамнезе. Врач подберёт дозу или альтернативный препарат. Необходим контроль анализов (креатинин, мочевина, калий). Гемодиализ При гемодиализе с высокопроточными мембранами возможны анафилактические реакции. Сообщите врачу о прошлых аллергических реакциях на ингибиторы АПФ. Может потребоваться смена препарата или типа мембраны. Аллергия, ангионевротический отёк При отёке лица, губ, языка, гортани — прекратите приём и вызовите скорую помощь. Риск выше: при наличии отёка в анамнезе у вас или родственников у лиц негроидной расы при сочетании с валсартаном /сакубитрилом (перерыв ⩾ 36 ч) при приёме ингибиторов mTOR (сиролимус, эверолимус и др.) при приёме рацекадотрила. Перед аферезом ЛПНП или десенсибилизацией — сообщите врачу, возможно временное прекращение приёма. Нарушение функции печени При желтухе или повышении печёночных ферментов — прекратите приём и обратитесь к врачу. Изменения крови (нейтропения, тромбоцитопения и др.) При признаках инфекции (боль в горле, температура) — сообщите врачу. Кашель Возможен упорный сухой кашель проходит после отмены препарата. Сообщайте врачу о кашле и приёме препарата. Хирургическое вмешательство / анестезия Предупредите хирурга/анестезиолога о приёме препарата. Возможно прекращение приёма за сутки до операции. Гиперкалиемия Возможен опасный рост уровня калия в крови. Факторы риска: почечная недостаточность возраст > 70 лет сахарный диабет обезвоживание, сердечная недостаточность приём калийсберегающих диуретиков, добавок калия, гепарина и др. Врач может назначить анализы для контроля калия. Сахарный диабет Периндоприл может снижать уровень глюкозы. В первый месяц — регулярный контроль глюкозы (при приёме гипогликемических средств или инсулина). Первичный гиперальдостеронизм Препарат неэффективен сообщите врачу о диагнозе или анализах на альдостерон. Дети и подростки Не применять у лиц до 18 лет (безопасность не установлена). Лактоза При непереносимости сахаров — проконсультируйтесь с врачом. Управление транспортом и механизмами Соблюдайте осторожность из-за риска гипотензии и головокружения.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребёнка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Храните препарат при температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке (блистер) для защиты от влаги.