Инструкция по применению
Периндоприл Реневал Таблетки 4 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Периндоприл
Количество в упаковке: 1

Описание

Периндоприл Реневал, 4 мг, таблетки Круглые двояковыпуклые таблетки белого или почти белого цвета с риской. Допускается наличие мраморности. Таблетку можно разделить на равные дозы.

Действующее вещество

Периндоприл

Состав

Препарат Периндоприл Реневал содержит Действующим веществом является периндоприл. Периндоприл Реневал, 4 мг, таблетки Каждая таблетка содержит 4 мг периндоприла эрбумина. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, кроскармеллоза натрия и магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Периндоприл Реневал показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет. Артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность (ХСН), профилактика повторного инсульта (комбинированная терапия с индапамидом) у пациентов, перенесших инсульт или транзиторное нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу, стабильная ишемическая болезнь сердца (ИБС): снижение риска развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов со стабильной ИБС.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Рекомендуемая доза: Принимайте препарат Периндоприл Реневал 1 раз в сутки. Подходящую Вам дозу препарата Периндоприл Реневал будет определять лечащий врач, исходя из Вашего заболевания, возраста и функции почек, а также Вашей реакции на препарат, которая определяется по изменению артериального давления. В некоторых случаях, например, если у Вас снижен объем циркулирующей крови или концентрации электролитов, наблюдается декомпенсация хронической сердечной недостаточности, нарушена функция почек или если Вы в пожилом возрасте, стартовая доза периндоприла должна составлять 2 мг 1 раз в сутки. Артериальная гипертензия Рекомендуемая начальная доза составляет 4 мг 1 раз в сутки. При необходимости через месяц после начала терапии врач может увеличить дозу препарата до 8 мг 1 раз в сутки. Сердечная недостаточность Лечение ХСН препаратом Периндоприл Реневал в комбинации с другими препаратами (диуретиками, дигоксином, бета-адреноблокаторами) начинают под тщательным медицинским наблюдением, назначая препарат в начальной дозе 2 мг 1 раз в сутки утром. Через 2 недели лечения доза препарата может быть повышена врачом до 4 мг 1 раз в сутки, при условии хорошей переносимости дозы 2 мг и удовлетворительного ответа на проводимую терапию. Профилактика повторного инсульта (комбинированная терапия с индапамидом) Лечение начинают, назначая препарат в начальной дозе 2 мг 1 раз в сутки в течение 2 недель. Через 2 недели лечения доза препарата может быть повышена врачом до 4 мг 1 раз в сутки в течение последующих 2 недель до применения индапамида. Лечение можно начинать в любое время (от 2 недель до нескольких лет) после перенесенного инсульта. ИБС: снижение риска сердечно-сосудистых осложнений у пациентов, ранее перенесших инфаркт миокарда и/или коронарную реваскуляризацию Если у Вас стабильное течение ишемической болезни сердца, лечение препаратом Периндоприл Реневал начинают с дозы 4 мг 1 раз в сутки. Через 2 недели при хорошей переносимости препарата и с учетом состояния функции почек врач может увеличить дозу до 8 мг 1 раз в сутки. Путь и (или) способ введения Внутрь, утром, перед приемом пищи, запивая стаканом воды. При необходимости таблетки препарата Периндоприл Ренвал 4 мг и 8 мг можно разделить на равные дозы по риске. Продолжительность терапии Продолжительность лечения определяет лечащий врач. Если Вы считаете, что эффект препарата слишком сильный или слишком слабый, проконсультируйтесь у лечащего врача. Если Вы забыли принять препарат Периндоприл Реневал Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Противопоказания

Не принимайте препарат Периндоприл Реневал: если у Вас аллергия на периндоприл, другие ингибиторы АПФ или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша), если у Вас в прошлом возникал отек лица, верхних и нижних конечностей, губ, слизистых оболочек, языка, голосовых складок и/или гортани (ангионевротический отек (отек Квинке)), связанный с приемом ингибиторов /АПФ, если у Вас имеется наследственный / с неизвестной причиной (идиопатический) ангионевротический отек), если у Вас сахарный диабет и/или умеренные или тяжелые нарушения функции почек (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 2 площади поверхности тела) и Вы принимаете алискирен и лекарственные препараты, содержащие алискирен, если у Вас заболевание почек, связанное с сахарным диабетом (диабе дичее кая нефропатия) и Вы применяете антагонисты рецепторов ангиотензина II (АРА II), если Вы применяете комбинированные лекарственные препараты, содержащие валсартан + сакубитрил, если Вы проходите диализ или другой тип фильтрации крови, если у Вас сужены сосуды, приносящие кровь к почкам (выраженный двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной функционирующей почки), если Вы беременны или кормите грудью. Если Вы считаете, что любое из перечисленного относится к Вам, сообщите об этом Вашему лечащему врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Беременность Применение препарата Периндоприл Реневал противопоказано во время беременности. Применение ингибиторов АПФ (таких как периндоприл) во втором и третьем триместрах беременности может привести к нарушениям развития плода (снижение функции почек, маловодие, задержка окостенения черепа, повышенное артериальное давление, повышенный уровень калия в крови). Если беременность наступила во время лечения препаратом Периндоприл Реневал, обратитесь к лечащему врачу. В подобных ситуациях врач посоветует Вам прекратить прием препарата и подберет другой препарат, более подходящий Вам. Грудное вскармливание Применение препарата Периндоприл Реневал противопоказано в период грудного вскармливания. Если Вы собираетесь кормить ребенка грудным молоком, обратитесь к лечащему врачу, чтобы он подобрал Вам другой препарат, более подходящий Вам. Не установлено влияния на репродуктивную функцию или фертильность.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам Периндоприл Реневал может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Прекратите прием препарата Периндоприл Реневал и немедленно обратитесь за медицинской помощью, в случае возникновения признаков любых из перечисленных далее нежелательных реакций, которые наблюдались: Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): затруднение дыхания из-за сужения просвета бронхов (бронхоспазм), затрудненное дыхание или глотание, сопровождающееся отеком лица, губ, языка или горла (ангионевротический отек), Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000): уменьшение количества выделяемой мочи, снижение артериального давления, появление отеков рук и ног (могут быть признаками острой почечной недостаточности), значительное снижение количества специфических клеток крови, называемых гранулоцитами (агранулоцитоз), значительное снижение количества всех форменных элементов крови (панцитопения), нарушение кровоснабжения сердечной мышцы (стенокардия или инфаркт миокарда), признаками которого может быть резкая и сильная боль в груди, иногда отдающая в левую руку, потливость, слабость, нарушение мозгового кровообращения (инсульт), признаками которого могут быть слабость в руках, ногах, проблемы с речью или мимикой, редкий тип воспаления легких (эозинофильная пневмония), признаками которого могут быть нарушения дыхания, кашель, ночная потливость, повышение температуры тела, воспаление поджелудочной железы (панкреатит), признаками которого могут быть боль в животе, тошнота, рвота, нарушения пищеварения, общая болезненность или напряжение мышц живота, воспаление печени (гепатит, в том числе цитолитический и холестатический), признаками которого могут быть расстройства пищеварения, слабость, тошнота, боль или тяжесть в правом боку, пожелтение кожи и белков глаз (желтуха), потемнение мочи, осветление кала, кожная сыпь, начинающаяся с появления красных зудящих пятен на лице, руках или ногах (мультиформная эритема). Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Периндоприл Реневал. Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10): головокружение, головная боль, спонтанно возникающие ощущения жжения, покалывания, ползания мурашек (парестезия), головокружение ощущением вращения (вертиго), нарушения зрения, звон в ушах, избыточное снижение артериального давления (артериальная гипотензия), кашель, одышка, боль в животе, запор, диарея, извращение вкусовых ощущений (дисгевзия), расстройство пищеварения (диспепсия), тошнота, рвота, кожный зуд, кожная сыпь, мышечные спазмы, непроходящая усталость (астения). Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): повышение количества специфических клеток, называемых эозинофилами, в крови (эозинофилия), снижение концентрации глюкозы в крови (гипогликемия), повышение концентрации калия в крови (гиперкалиемия), снижение концентрации натрия в крови (гипонатриемия), перепады настроения (лабильность настроения), нарушение сна,

сонливость, кратковременная потеря сознания (обморок), ощущение сердцебиения, ускоренное сердцебиение (тахикардия), воспаление по ходу сосудов (васкулит), сухость во рту, появление зудящей сыпи на коже (крапивница), покраснение или воспаление кожи из-за воздействия света (реакции фото чувствительности), воспаление кожи с образованием пузырей, заполненных жидкостью (пемфигоид), повышенное потоотделение, боль в суставах (артралгия), мышечная боль (миалгия), почечная недостаточность, импотенция (эректильная дисфункция), боль в грудной клетке, недомогание, отеки рук или ног (периферические отеки), повышение температуры тела (лихорадка), повышение концентрации мочевины в крови, повышение концентрации креатинина в крови, потеря равновесия, в т.ч. из-за головокружения или резкого снижения артериального давления (падение). Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000): обострение псориаза (хроническое воспалительное заболевание кожи), повышение концентрации билирубина в крови, повышение активности «печеночных» ферментов. Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000): значительное снижение количества лейкоцитов в крови (лейкопения), снижение количества специфических клеток крови, называемых нейтрофилами (нейтропения), которое может приводить к повышению риска инфекций, разрушение красных кровяных клеток (гемолитическая анемия), которое возникает у пациентов с врожденной недостаточностью глюкозо-5-фосфатдегидрогеназы, снижение количества тромбоцитов в крови (тромбоцитопения), снижение концентрации гемоглобина или количества форменных элементов (гематокрита) в крови, синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (СНСАДГ), признаками которого могут быть потемнение мочи, тошнота или рвота, мышечные спазмы, спутанность сознания и судороги, спутанность сознания, нарушение сердечного ритма (аритмия), воспаление слизистой оболочки носа (ринит). Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно): синдром Рейно, характеризующийся изменением цвета кожи (бледностью), онемением и болью в пальцах рук и ног. Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом, работником аптеки или медицинской сестрой. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы приняли препарата Периндоприл Реневал больше, чем следовало Если Вы приняли больше назначенной дозы, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если возможно, возьмите таблетки или коробку с препаратом с собой, чтобы показать врачу. Наиболее вероятным эффектом в случае передозировки является понижение артериального давления, из-за чего Вы можете почувствовать головокружение или потерять сознание. Если это случилось, лягте на спину и поднимите ноги, это может облегчить Ваше состояние. Также симптомы, связанные с передозировкой ингибиторами АПФ, могут включать опасное для жизни состояние нарушения кровообращения, приводящее к неспособности организма поддерживать доставку крови в ткани организма и удовлетворять потребности в кислороде (циркуляторный шок), нарушения водноэлектролитного баланса (изменение содержания солей в организме), нарушение функции почек, учащенное поверхностное дыхание, учащенное сердцебиение, ощущение сердцебиения, замедленное сердцебиение, головокружение, беспокойство и кашель.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Обязательно сообщите врачу, если Вы принимаете любой из нижеперечисленных препаратов: другие лекарственные препараты для лечения повышенного артериального давления, включая ингибиторы АПФ, АРА II, алискирен (см. также Противопоказания), диуретики (препараты, увеличивающие объем мочи, выделяемой почками), калийсберегающие диуретики (такие как триамтерен, амилорид, эплеренон, спиронолактон), пищевые добавки с калием или заменители солей, содержащие калий, и другие лекарственные препараты, которые могут увеличить содержание калия в организме (такие как гепарин и ко-тримоксазол, также известный как комбинированный лекарственный препарат, содержащий сульфаметоксазол + триметоприм), калийнесберегающие диуретики (например, фуросемид), препараты лития (применяются при мании или депрессии, нестероидные противовоспалительные лекарственные препараты (например, ибупрофен), ингибиторы циклооксигеназы-2 (например, вальдекоксиб, эторикоксиб) для снятия боли или ацетилсалициловую кислоту (аспирин) в высоких дозах (3000 мг в сутки и более), препараты для лечения сахарного диабета, такие как инсулин, метформин или глиптины (линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин), баклофен (применяется при лечении ригидности мышц при таких заболеваниях как рассеянный склероз), препараты для лечения психических нарушений - депрессии, тревоги, шизофрении и др. (например, трициклические антидепрессанты, антипсихотические средства), иммунодепрессанты, которые

используются для лечения аутоиммунных нарушений или после трансплантационных операций для предупреждения отторжения (например, циклоспорин, такролимус), триметоприм (для лечения инфекций), экстрамустин (применяется при лечении онкологических заболеваний), препараты, которые наиболее часто используются для лечения диареи (рацекадотрил) или для профилактики отторжения трансплантированных органов (сиролимус, эверолимус, темсиролимус и другие препараты, принадлежащие к классу так называемых ингибиторов mTOR), комбинация валсартана и сакубитрила, которая применяется для лечения хронической сердечной недостаточности (см. Противопоказания), аллопуринол (для лечения подагры), прокаинамид (для лечения нерегулярного сердечного ритма), сосудорасширяющие препараты, включая нитраты (препараты, вызывающие расширение кровеносных сосудов), препараты, которые используются для лечения пониженного артериального давления, шока или астмы (например, эфедрин, норадреналин или адреналин), препараты золота для внутривенного введения (применяется при лечении симптомов ревматоидного артрита), рекомбинантные тканевые активаторы плазминогена (rtPA, алтеплаза): препараты, используемые для растворения сгустков крови при опасных для жизни сердечнососудистых заболеваниях, таких как ишемический инсульт. В некоторых случаях применение перечисленных препаратов вместе с препаратом Периндоприл Реневал противопоказано (см.Противопоказания) или требует особых мер предосторожности (см. Особые указания и меры предосторожности).

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Хранить в контурной ячейковой упаковке в пачке при температуре ниже 25 °С.