Инструкция по применению
Периндоприл-АЛСИ Таблетки 4 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Алси Фарма
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Периндоприл
Количество в упаковке: 30



Описание

Периндоприл-АЛСИ, 4 мг, таблетки Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого или почти белого цвета с фаской и риской на одной стороне.

Действующее вещество

Периндоприл

Состав

Препарат Периндоприл-АЛСИ содержит Действующим веществом является периндоприл. Периндоприл-АЛСИ, 4 мг, таблетки Каждая таблетка содержит 4 мг периндоприла эрбумина. Прочими ингредиентами являются: целлюлоза микрокристаллическая, магния оксид, кроскармеллоза натрия, маннитол, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Периндоприл-АЛСИ показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет. артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность (ХСН), профилактика повторного инсульта (комбинированная терапия с индапамидом) у пациентов, перенёсших инсульт или транзиторное нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу, стабильная ишемическая болезнь сердца (ИБС): снижение риска развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов со стабильной ИБС.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат Периндоприл-АЛСИ в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Рекомендуемая доза Принимайте препарат Периндоприл-АЛСИ 1 раз в сутки. Подходящую Вам дозу препарата Периндоприл-АЛСИ будет определять лечащий врач, исходя из Вашего заболевания, возраста и функции почек, а также Вашей реакции на препарат, которая определяется по изменению артериального давления. В некоторых случаях, например, если у Вас снижен объем циркулирующей крики или концентрации электролитов, наблюдается декомпенсация хронической сердечной недостаточности, нарушена функция почек или если Выв пожилом возрасте, стартовая доза периндоприла должна составлять 2 мг 1 раз в сутки. Артериальная гипертензия Рекомендуемая начальная доза составляет 4 мг 1 раз в сутки. При необходимости через месяц после начала терапии врач может увеличить дозу препарата до 8 мг 1 раз в сутки. Хроническая сердечная недостаточность Лечение ХСН препаратом Периндоприл-АЛСИ в комбинации с другими препаратами (диуретиками, дигоксином, бета-адреноблокаторами) начинают под тщательным медицинским наблюдением, назначая препарат в начальной дозе 2 мг 1 раз в сутки утром. Через 2 недели лечения доза препарата может быть повышена врачом до 4 мг 1 раз в сутки, при условии хорошей переносимости дозы 2 мг и удовлетворительного ответа на проводимую терапию. Профилактика повторного инсульта (комбинированная терапия с индапамидом) Лечение начинают, назначая препарат в начальной дозе 2 мг 1 раз в сутки в течение 2 недель. Через 2 недели лечения доза препарата может быть повышена врачом до 4 мг 1 раз в сутки в течение последующих 2 недель до применения индапамида. Лечение можно начинать в любое время (от 2 недель до нескольких лет) после перенесённого инсульта. ИБС: снижение риска сердечно-сосудистых осложнений у пациентов, ранее перенёсших инфаркт миокарда и/или коронарную реваскуляризацию Если у Вас стабильное течение ишемической болезни сердца, лечение препаратом Периндоприл-АЛСИ начинают с дозы 4 мг 1 раз в сутки. Через 2 недели при хорошей переносимости препарата и с учётом состояния функции почек врач может увеличить дозу до 8 мг 1 раз в сутки. Путь и (или) способ введения Внутрь, утром, перед приёмом пищи, запивая стаканом воды. При необходимости таблетки препарата Периндоприл-АЛСИ 4 мг и 8 мг можно разделить на равные дозы. Продолжительность терапии Продолжительность лечения определяет лечащий врач. Если Вы считаете, что эффект препарата слишком сильный или слишком слабый, проконсультируйтесь у лечащего врача.

Противопоказания

Не принимайте препарат Периндоприл-АЛСИ: если у Вас аллергия на периндоприл, другие ингибиторы АПФ или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша), если у Вас в прошлом возникал отёк лица, верхних и нижних конечностей, губ, слизистых оболочек, языка, голосовых складок и/или гортани (ангионевротический отёк (отёк Квинке)), связанный с приёмом ингибиторов АПФ, если у Вас имеется наследственный / с неизвестной причиной (идиопатический) ангионевротический отёк, если у Вас сахарный диабет и/или умеренные или тяжёлые нарушения функции почек (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 2 площади поверхности тела) и Вы принимаете алискирен и лекарственные препараты, содержащие алискирен, если у Вас заболевание почек, связанное с сахарным диабетом (диабетическая нефропатия), и Вы принимаете антагонисты рецепторов ангиотензина II (АРА II), если Вы принимаете комбинированные лекарственные препараты, содержащие валсартан + сакубитрил, если Вы проходите диализ или другой тип фильтрации крови, если у Вас сужены сосуды, приносящие кровь к почкам (выраженный двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной функционирующей почки), если Вы беременны или кормите грудью. Если Вы считаете, что любое из перечисленного относится к Вам2 сообщите об этом Вашему лечащему врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Беременность Применение препарата Периндоприл-АЛСИ противопоказано во время беременности. Применение ингибиторов АПФ (таких как периндоприл) во втором и третьем триместрах беременности может привести к нарушениям развития плода (снижение функции почек, маловодие, задержка окостенения черепа, повышенное артериальное давление, повышенный уровень калия в крови). Если беременность наступила во время лечения препаратом Периндоприл-АЛСИ, обратитесь к лечащему врачу. В подобных ситуациях врач посоветует Вам прекратить приём препарата и подберёт другой препарат, более подходящий Вам. Грудное вскармливание Применение препарата Периндоприл-АЛСИ противопоказано в период грудного вскармливания. Если Вы собираетесь кормить ребёнка грудным молоком, обратитесь к лечащему врачу, чтобы он подобрал Вам другой препарат, более подходящий Вам. Не установлено влияния на репродуктивную функцию или фертильность.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Периндоприл-АЛСИ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Прекратите приём препарата Периндоприл-АЛСИ и немедленно обратитесь за медицинской помощью, в случае возникновения признаков любых из перечисленных далее нежелательных реакций, которые наблюдались: Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): затруднение дыхания из-за сужения просвета бронхов (бронхоспазм), затруднённое дыхание или глотание, сопровождающееся отёком лица, губ, языка или горла (ангионевротический отёк), Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000): уменьшение количества выделяемой мочи, снижение артериального давления, появление отёков рук и ног (могут быть признаками острой почечной недостаточности), значительное снижение количества специфических клеток крови, называемых гранулоцитами (агранулоцитоз), значительное снижение количества всех форменных элементов крови (панцитопения), нарушение кровоснабжения сердечной мышцы (стенокардия или инфаркт миокарда), признаками которого может быть резкая и сильная боль в груди, иногда отдающая в левую руку, потливость, слабость, нарушение мозгового кровообращения (инсульт), признаками которого могут быть слабость в руках, ногах, проблемы с речью или мимикой, редкий тип воспаления лёгких (эозинофильная пневмония), признаками которого могут быть нарушения дыхания, кашель, ночная потливость, повышение температуры тела, воспаление поджелудочной железы (панкреатит), признаками которого могут быть боль в животе, тошнота, рвота, нарушения пищеварения, общая болезненность или напряжение мышц живота, воспаление печени (гепатит, в том числе цитолитический и холестатический), признаками которого могут быть расстройства пищеварения, слабость, тошнота, боль или тяжесть в правом боку, пожелтение кожи и белков глаз (желтуха), потемнение мочи, осветление кала, кожная сыпь, начинающаяся с появления красных зудящих пятен на лице, руках или ногах (мультиформная эритема). Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приёме препарата Периндоприл-АЛСИ. Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10): головокружение, головная боль, спонтанно возникающие ощущения жжения, покалывания, ползания мурашек (парестезия), головокружение с ощущением вращения (вертиго), нарушения зрения, звон в ушах, избыточное снижение артериального давления (артериальная гипотензия), кашель, одышка, боль в животе, запор, диарея, извращение вкусовых ощущений (дисгевзия), расстройство пищеварения (диспепсия), тошнота, рвота, кожный зуд, кожная сыпь, мышечные спазмы, непроходящая усталость (астения). Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): повышение количества специфических клеток, называемых эозинофилами, в крови (эозинофилия), снижение концентрации глюкозы в крови (гипогликемия), повышение концентрации калия в крови (гиперкалиемия), снижение концентрации натрия в крови (гипонатриемия), перепады настроения

(лабильность настроения), нарушение сна, сонливость, кратковременная потеря сознания (обморок), ощущение сердцебиения, ускоренное сердцебиение (тахикардия), воспаление по ходу сосудов (васкулит), сухость во рту, появление зудящей сыпи на коже (крапивница), покраснение или воспаление кожи из-за воздействия света (реакции фоточувствительности), воспаление кожи с образованием пузырей, заполненных жидкостью (пемфигоид), повышенное потоотделение, боль в суставах (артралгия), мышечная боль (миалгия), почечная недостаточность, импотенция (эректильная дисфункция), боль в грудной клетке, недомогание, отеки рук или ног (периферические отёки), повышение температуры тела (лихорадка), повышение концентрации мочевины в крови, повышение концентрации креатинина в крови, потеря равновесия, в том числе из-за головокружения или резкого снижения артериального давления (падение). Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000): обострение псориаза (хроническое воспалительное заболевание кожи), повышение концентрации билирубина в крови, повышение активности печёночных ферментов. Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000): значительное снижение количества лейкоцитов в крови (лейкопения), снижение количества специфических клеток крови, называемых нейтрофилами (нейтропения), которое может приводить к повышению риска инфекций, разрушение красных кровяных клеток (гемолитическая анемия), которое возникает у пациентов с врождённой недостаточностью глюкозо-5-фосфатдегидрогеназы, снижение количества тромбоцитов в крови (тромбоцитопения), снижение концентрации гемоглобина или количества форменных элементов (гематокрита) в крови, синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (СНСАДГ), признаками которого могут быть потемнение мочи, тошнота или рвота, мышечные спазмы, спутанность сознания и судороги, спутанность сознания, нарушение сердечного ритма (аритмия), воспаление слизистой оболочки носа (ринит). Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно): синдром Рейно, характеризующийся изменением цвета кожи (бледностью), онемением и болью в пальцах рук и ног. Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств - членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы приняли препарата Периндоприл-АЛСИ больше, чем следовало Если Вы приняли больше назначенной дозы, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если возможно, возьмите таблетки или коробку с препаратом с собой, чтобы показать врачу. Наиболее вероятным эффектом в случае передозировки является понижение артериального давления, из-за чего Вы можете почувствовать головокружение или потерять сознание. Если это случилось, лягте на спину и поднимите ноги, это может облегчить Ваше состояние. Также симптомы, связанные с передозировкой ингибиторами АПФ, могут включать опасное для жизни состояние нарушения кровообращения, приводящее к неспособности организма поддерживать доставку крови в ткани организма и удовлетворять потребности в кислороде (циркуляторный шок), нарушения водно-электролитного баланса (изменение содержания солей в организме), нарушение функции почек, учащённое поверхностное дыхание, учащённое сердцебиение, ощущение сердцебиения, замедленное сердцебиение, головокружение, беспокойство и кашель. Если Вы забыли принять препарат Периндоприл-АЛСИ Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. При наличии вопросов по приёму препарата обратитесь к лечащему врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Обязательно сообщите врачу, если Вы принимаете любой из нижеперечисленных препаратов: другие лекарственные препараты для лечения повышенного артериального давления, включая ингибиторы АПФ, АРА II, алискирен (см. также Противопоказания), диуретики (препараты, увеличивающие объем мочи, выделяемой почками), калийсберегающие диуретики (такие как триамтерен, амилорид, эплеренон, спиронолактон), пищевые добавки с калием или заменители солей, содержащие калий, и другие лекарственные препараты, которые могут увеличить содержание калия в организме (такие как гепарин и ко-тримоксазол, также известный как комбинированный лекарственный препарат, содержащий сульфаметоксазол + триметоприм), калийнесберегающие диуретики (например, фуросемид), препараты лития (применяются при мании или депрессии), нестероидные противовоспалительные лекарственные препараты (например, ибупрофен), ингибиторы циклооксигеназы-2 (например, вальдекоксиб, эторикоксиб) для снятия боли или ацетилсалициловую кислоту (аспирин) в высоких дозах (30'00 мг в сутки и более), препараты для лечения сахарного диабета, такие как инсулин, метформин или глиптины (линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вилдаглиптин), баклофен (применяется при лечении ригидности мышц при таких

заболеваниях как рассеянный склероз), препараты для лечения психических нарушений - депрессии, тревоги, шизофрении и др. (например, трициклические антидепрессанты, антипсихотические средства), иммунодепрессанты, которые используются для лечения аутоиммунных нарушений или после трансплантационных операций для предупреждения отторжения (например, циклоспорин, такролимус), триметоприм (для лечения инфекций), эстрамустин (применяется при лечении онкологических заболеваний), препараты, которые наиболее часто используются для лечения диареи (рацекадотрил) или для профилактики отторжения трансплантированных органов (сиролимус, эверолимус, темсиролимус и другие препараты, принадлежащие к классу так называемых ингибиторов mTOR), комбинация валсартана и сакубитрила, которая применяется для лечения хронической сердечной недостаточности (см. Противопоказания), аллопуринол (для лечения подагры), прокаинамид (для лечения нерегулярного сердечного ритма), сосудорасширяющие препараты, включая нитраты (препараты, вызывающие расширение кровеносных сосудов), препараты, которые используются для лечения пониженного артериального давления, шока или астмы (например, эфедрин, норадреналин или адреналин), препараты золота для внутривенного введения (применяется при лечении симптомов ревматоидного артрита), рекомбинантные тканевые активаторы плазминогена (rtPA, алтеплаза): препараты, используемые для растворения сгустков крови при опасных для жизни сердечно-сосудистых заболеваниях, таких как ишемический инсульт. В некоторых случаях применение перечисленных препаратов вместе с препаратом Периндоприл-АЛСИ противопоказано (см. Противопоказания) или требует особых мер предосторожности (см. Особые указания и меры предосторожности).

Особые указания

Важные предупреждения при приёме Периндоприл-АЛСИ: Ишемическая болезнь сердца: при появлении боли в груди, отдающей в левую руку или челюсть, немедленно обратитесь к врачу. Артериальная гипотензия: может вызывать головокружение. При симптомах примите горизонтальное положение с приподнятыми ногами. Почечная недостаточность: сообщите врачу о заболеваниях почек — он подберёт дозировку. Аллергические реакции: возможен ангионевротический отёк. Прекратите приём и срочно обратитесь к врачу при отёке лица, губ, языка. Особые риски: Повышенный риск отёка при негроидной расе Опасность при сочетании с валсартаном и сакубитрилом Риск при гемодиализе Опасность при сахарном диабете Другие важные указания: При планировании операций сообщите врачу о приёме препарата Контролируйте уровень калия в крови Пациентам с диабетом — регулярный контроль глюкозы Не применять детям до 18 лет При сухом кашле сообщите врачу Немедленно обратитесь к врачу при: Признаках инфекции Желтухе Сильном падении давления Аллергических реакциях

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребёнка месте так, чтобы ребёнок не мог увидеть его. Храните препарат при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке (контурная ячейковая упаковка в пачке).