Инструкция по применению
Перхотал 2% Мазь 15 г



Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Индия
Производитель: Гепач
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Кетоконазол
Количество в упаковке: 1

Описание

Однородная мазь белого цвета.

Действующее вещество

Кетоконазол

Состав

В 100 г мази содержится: активное вещество: кетоконазол 2,0 г, вспомогательные вещества: макрогола 400, макрогола 4000.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

Всасывание действующего вещества через кожу при местном применении незначительно. При длительном применении содержание кетоконазола в крови не определяется.

Показания

Местное лечение микозов, вызванных чувствительными к препарату грибами: паховая эпидермофития, эпидермофития кистей и стоп, кандидоз кожи, отрубевидный лишай, себорейный дерматит, вызванный Pityrosporum ovale.

Способ применения и дозы

При дерматомикозе гладкой кожи (паховой эпидермофитии, эпидермофитии кистей и стоп, кандидозе кожи и отрубевидном лишае) мазь наносят на пораженную и непосредственно прилегающую к ней область 1 раз в сутки. При себорейном дерматите мазь наносят на пораженную область 2 раза в сутки. Средняя продолжительность лечения составляет: - при дерматомикозе гладкой кожи - 3-4 недели, - при паховой эпидермофитии - 2-4 недели, - при эпидермофитии стоп - 4-6 недель, - при инфекциях, вызванных дрожжеподобными грибами - 2-3 недели, - при отрубевидном лишае - 2-3 недели, - при себорейном дерматите - 2-4 недели.

Противопоказания

Мазь Перхотал не следует применять при повышенной чувствительности к кетоконазолу, при нарушении целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения мази, женщинам в период лактации.

Побочные действия

При местном применении мази ПЕРХОТАЛ возможны местные аллергические реакции в виде жжения, крапивницы и кожной сыпи. В редких случаях возникает контактный дерматит.

Передозировка

Поскольку препарат предназначен только для наружного применения и практически не всасывается в системный кровоток, развитие симптомов передозировки маловероятно. При случайном приеме мази внутрь следует провести промывание желудка и провести симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата ПЕРХОТАЛ при наружном применении не описано.

Особые указания

Препарат предназначен только для наружного применения, не применяют в офтальмологической практике. Следует избегать попадания мази в глаза. При комбинированном длительном применении с местными лекарственными формами глюкокортикостероидов (ГКС) для предотвращения развития синдрома отмены рекомендуется использовать ГКС утром, а мазь ПЕРХОТАЛ - вечером, с последующей постепенной отменой ГКС в течение 2-3 недель. Во время лечения следует соблюдать общие правила гигиены. Информация о наличии каких-либо неблагоприятных эффектов у детей отсутствует, эффективность и безопасность применения у них не установлены.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:

Условия хранения

При температуре не выше 30°С. В недоступном для детей месте.