Инструкция по применению
Перхотал Шампунь 1 % 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Шампунь
Страна: Индия
Производитель: Гепач
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Кетоконазол
Количество в упаковке: 1



Описание

Перхотал - противогрибковое средство, обладает активностью в отношении дерматофитов, дрожжевых грибов, диморфных грибов и эумицетов. Активен также в отношении стафилококков и стрептококков. Механизм действия заключается в ингибировании синтеза эргостерола грибов. Предотвращает превращение бластоспор Candida albicans в инвазивные формы.

Действующее вещество

Кетоконазол

Состав

В 100 г шампуня содержится: Активное вещество: кетоконазол - 1 г. Вспомогательные компоненты: натрия лаурилсульфат, диэтаноламид кокосового масла жирных кислот, полисорбат 80, натрия хлорид, пропиленгликоль, динатрия эдетат, хлористоводородная кислота, троламин, акриламида и диаллилдиметиламмония хлорида сополимер (поликватерниум-7), этиленгликоля моностеарат, вода очищенная, ароматические добавки и красители: шампунь 1% - ароматизатор SSB D 01274, краситель бриллиантовый голубой, Е133.

Форма выпуска

Шампунь

Фармакокинетика

Всасывание действующих веществ через кожу при местном применении незначительно. Поскольку даже при длительном применении содержание кетоконазола в крови не определяется, можно прийти к заключению, что системным действием препарат не обладает.

Показания

Лечение и профилактика поражений кожи волосистой части головы, вызванных дрожжеподобными микроорганизмами Malassezia furfur (Pityrosporum ovale), таких как отрубевидный лишай, себорейный дерматит волосистой части головы и различные виды перхоти.

Способ применения и дозы

Шампунь наносят на пораженные участки кожи и волос, затем через 3-5 минут смывают водой. Для лечения плесневых микозов применяют 1 раз в день в течение 5 дней, для их профилактики - 1 раз в день в течение 3 дней. Для лечения перхоти используют 1% шампунь каждые 3-4 дня в течение 8 недель, для ее профилактики применяют только в случае необходимости под контролем клинических проявлений.

Противопоказания

Шампунь Перхотал противопоказан при наличии повышенной чувствительности к любому из его компонентов. С осторожностью: В результате клинических исследований кетоконазол в плазме не обнаружен, тем не менее, женщинам в период беременности и лактации следует принимать шампунь Перхотал 2% с осторожностью.

Побочные действия

Шампунь Перхотал, как правило, хорошо переносится, но могут отмечаться местные реакции: - местное раздражение кожи, зуд и жжение кожи, повышенная жирность или сухость волос, выпадение волос, - аллергические реакции (крапивница, кожная сыпь). В отдельных случаях, в основном у пациентов с химически поврежденными или седыми волосами, отмечалось изменение цвета волос.

Передозировка

При использовании шампуня Перхотал развитие передозировки не предполагается, так как препарат предназначен только для наружного применения.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата Перхотал при наружном применении не описано.

Особые указания

При комбинированном длительном применении с местными лекарственными формами ГКС для предотвращения развития синдрома "отмены" рекомендуется использовать ГКС утром, а кетоконазол - вечером, с последующей постепенной отменой ГКС в течение 2-3 нед.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C.