Инструкция по применению
Пермиксон Капсулы 160 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Франция
Производитель: Pierre Fabre
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Пальмы ползучей плодов экстракт
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 160 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Пальмы ползучей плодов экстракт

Состав

1 капсула содержит: Активное вещество: Серенoа ползучей плодов экстракта липидостеролового - Serenoa repens - (LSESR) - 160 мг. Вспомогательные вещества: макрогол 10000 Капсула (основание и крышечка) № 1 состоит: титана диоксид, индиго кармин, железа оксид желтый, желатин.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Пермиксон не предоставлены.

Показания

Доброкачественная гиперплазия (аденома) предстательной железы I и II стадии.

Способ применения и дозы

Внутрь по 160 мг (1 капсула) 2 раза в сутки или однократно утром, не разжевывая, во время еды. Продолжительность курса лечения должна составлять не менее 3 месяцев. Оптимальную схему и повторные курсы лечения устанавливает и назначает врач индивидуально в каждом конкретном случае на основе диагностического обследования.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Побочные действия

Неблагоприятные реакции классифицированы в соответствии с медицинским словарем для нормативноправовой деятельности MedDRA и систематизированы по частоте развития в соответствии с Классификацией ВОЗ: очень частые - 1/10 назначений (≥ 10%); частые - 1/100 назначений (≥ 1%, но < 10%); нечастые - 1/1000 назначений (≥ 0,1%, но < 1%); редкие - 1/10000 назначений (≥ 0,01%, но Нарушения со стороны нервной системы: часто - головная боль. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: часто - боль в животе; нечасто - тошнота. Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей: нечасто - увеличение активности гамма- глутамилтрансферазы, увеличение активности трансаминаз. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: нечасто - сыпь. Нарушения со стороны половых органов и молочной железы: нечасто - гинекомастия (обратима после прекращения лечения). Аллергические реакиии: частота неизвестна (не может быть оценена по имеющимся данным) - отек. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата Пермиксон не сообщалось.; При случайном приеме внутрь большого количества препарата необходимо провести промывание желудка.

Взаимодействие с другими препаратами

Не выявлено антагонизма Пермиксона и препаратов из групп, наиболее часто употребляемых при лечении данного заболевания: антибиотиков, уросептиков и противовоспалительных средств.

Особые указания

Пермиксон рекомендуется принимать во время еды.

Условия хранения

Беречь от детей