Инструкция по применению
Персен Таблетки покрытые оболочкой 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Чехия
Производитель: Зентива
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Валерианы лекарственной корневищ с корнями+Мелиссы лекарственной травы+Мяты перечной листьев] экстракт
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 50 мг+ 25 мг+ 25 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Валерианы лекарственной корневищ с корнями+Мелиссы лекарственной травы+Мяты перечной листьев] экстракт

Состав

Таблетки, покрытые оболочкой 1 табл. активные вещества: валерианы корневищ с корнями экстракт сухой 50 мг, мелиссы лекарственной листьев экстракт сухой 25 мг, мяты перечной листьев экстракт сухой 25 мг. вспомогательные вещества: тальк, магния стеарат, кросповидон, крахмал кукурузный, кремния диоксид коллоидный, МКЦ, лактоза оболочка капсулы: гидроксипропилметилцеллюлоза (Hypromellose, Pharmacoat), тальк, натрийкарбоксиметилцеллюлоза, повидон, сахароза, кремния диоксид коллоидный, кальция карбонат, титана диоксид, краситель коричневый 75, глицерин, воск E Hoechst (Capol 600)

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике не предоставлены.

Показания

Повышенная нервная возбудимость,бессонница, раздражительность.

Способ применения и дозы

Внутрь, запивая водой, независимо от приема пищи. Взрослым и подросткам старше 12 лет: при повышенной нервной возбудимости, раздражительности - по 2–3 табл., покрытые оболочкой, 2–3 раза в день; при бессоннице - по 2–3 табл., покрытые оболочкой, за 1 ч перед сном. Максимальная дневная доза составляет 12 табл. в день. При прекращении лечения синдрома отмены не возникает. Не следует применять препарат непрерывно более 1,5–2 мес.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Артериальная гипотензия. Холангит, желчнокаменная болезнь и другие заболевания желчевыводящих путей. Беременность. Период грудного вскармливания. Детский возраст до 12 лет. С осторожностью: пациенты с гэрб.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период лактации противопоказано.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (гиперемия, кожная сыпь, периферические отеки, аллергический дерматит), бронхоспазм, при длительном применении - запор.

Передозировка

Симптомы: однократный прием 20 г корневищ с корнями валерианы (приблизительно 103 таб. препарата Персен) может вызвать ощущение усталости, спазмы в желудке, ощущение сжатия в груди, головокружение, тремор рук, расширение зрачков, которые могут пройти самостоятельно в течение 24 ч. Лечение: рекомендуется промывание желудка; при необходимости проводят симптоматическую терапию. При явлениях передозировки пациент должен обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении препарата с другими лекарственными средствами, угнетающими ЦНС (в т.ч. снотворными препаратами, гипотензивными средствами центрального действия, анальгетиками), возможно усиление действия на ЦНС (может потребоваться коррекция доз).

Особые указания

У пациентов с ГЭРБ возможно ухудшение симптомов. Если во время применения препарата симптомы сохраняются или утяжеляются, пациенту следует проконсультироваться с врачом. Не следует применять препарат непрерывно более 1.5-2 месяцев. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами: В период лечения препаратом следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении