Инструкция по применению
Персен Таблетки покрытые оболочкой 40 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Чехия
Производитель: Зентива
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Валерианы лекарственной корневищ с корнями+Мелиссы лекарственной травы+Мяты перечной листьев] экстракт
Количество в упаковке: 40
Дозировка действующего вещества: 50 мг+25 мг+25 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Валерианы лекарственной корневищ с корнями+Мелиссы лекарственной травы+Мяты перечной листьев] экстракт

Состав

Действующее вещество: Валериана (Valerian), мята перечная (Peppermint), мята лимонная (Melissa)Концентрация действующего вещества (мг): Экстракт валерианы (сухой) 50 мг, экстракт мелиссы (сухой) 25 мг, экстракт мяты перечной (сухой) 25 мг.

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике не предоставлены.

Способ применения и дозы

Внутрь, запивая водой, независимо от приема пищи. Взрослые и дети старше 12 лет: при повышенной нервной возбудимости, раздражительности - по 2–3 таблетки, покрытые оболочкой, 2–3 раза в день; при бессоннице - по 2–3 таблетки, покрытые оболочкой, за 30 минут - 1 час перед сном.Максимальная дневная доза составляет 12 таблеток в день.При прекращении лечения синдрома отмены не возникает.Не следует применять препарат непрерывно более 1,5–2 месяцев.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата;дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;дефицит сахаразы /изомальтазы, непереносимость фруктозы;артериальная гипотензия;холангит, желчекаменная болезнь и другие заболевания желчевыводящих путей;детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

У пациентов с ГЭРБ возможно ухудшение симптомов.Если во время применения препарата симптомы сохраняются или утяжеляются, пациенту следует проконсультироваться с врачом.Не следует применять препарат непрерывно более 1.5-2 месяцев.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиВ период лечения препаратом следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Побочные действия

При одновременном применении препарата с другими лекарственными средствами, угнетающими ЦНС (в т.ч. снотворными препаратами, гипотензивными средствами центрального действия, анальгетиками), возможно усиление действия на ЦНС (может потребоваться коррекция доз).

Передозировка

Возможны аллергические реакции(гиперемия, кожная сыпь, периферические отеки, аллергический дерматит), бронхоспазм, при длительном применении - запор.

Взаимодействие с другими препаратами

Меры предосторожности

Особые указания

Однократный прием 20 г корневищ с корнями валерианы (примерно 103 табл. препарата Персен) может вызвать ощущение усталости, спазмы в желудке, ощущение сжатия в груди, головокружение, дрожание рук, расширение зрачков, которые могут исчезнуть самостоятельно в течение 24 ч.При явлениях передозировки целесообразно провести промывание желудка и обратиться к врачу.

Условия хранения

Беречь от детей