# Инструкция по применению
# Пертуссин Сироп 100 г

## Характеристики




Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Флора Кавказа
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Тимьяна ползучего травы экстракт+[Калия бромид]
Количество в упаковке: 1

## Описание

Густая жидкость коричневого цвета с ароматным запахом.

## Действующее вещество

Тимьяна ползучего травы экстракт+[Калия бромид]

## Состав

Активные вещества Чабреца экстракт жидкий 12,0 г Калия бромид 1,0 г Вспомогательные вещества Сахарный сироп (сахароза, 82,0 г вода) Этанол (этиловый спирт) 95 % 4,06 г Вода очищенная 0,94 г

## Форма выпуска

Сироп

## Показания

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, трахеитов, бронхитов, а также при коклюше.

**Способ применения и дозы**

Препарат принимают внутрь, после еды (в связи с возможностью снижения аппетита). Взрослым по 1 столовой ложке 3 раза в день, детям от 3 до 6 лет - по 1/2 - 1 чайной ложке 3 раза в день, детям от 6 до 12 лет - по 1-2 чайные ложки 3 раза в день, детям старше 12 лет - по 1 десертной ложке 3 раза в день. Курс лечения 10-14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия, хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации), дефицит сахаразы /изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст (до 3 лет).

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции, изжога.

**Передозировка**

В случае передозировки препарата возможна тошнота. Лечение: симптоматическое.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

**Особые указания**

Препарат содержит 8-11 % этанола. Содержание абсолютного спирта составляет: в 1 чайной ложке (5 мл) - до 0,43 г, в 1 десертной ложке (10 мл) - до 0,87 г, в 1 столовой ложке (15 мл) - до 1,3 г. В максимальной суточной дозе препарата для взрослых - 3 столовые ложки (45 мл) содержится до 3,9 г абсолютного спирта. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Указание для больных сахарным диабетом: содержание сахарозы в 1 чайной ложке (5 мл) препарата соответствует примерно 0,32 ХЕ, в 1 десертной ложке (10 мл) - примерно 0,64 ХЕ, в 1 столовой ложке - примерно 0,96 ХЕ.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Условия хранения**

В сухом месте при температуре от 12 до 15 °С Хранить в недоступном для детей месте.