Инструкция по применению
Пертуссин Сироп 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Самарамедпром
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Тимьяна ползучего травы экстракт+[Калия бромид]
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 48

Описание

Пертуссин сироп является комбинированным лечебным средством с активными ингредиентами растительного происхождения, благодаря которым и проявляется его основное отхаркивающее действие.

Действующее вещество

Тимьяна ползучего травы экстракт+[Калия бромид]

Состав

Активные вещества: чабреца экстракт жидкий, калия бромид. Вспомогательные вещества: сахарный сироп (сахароза, вода), этанол (этиловый спирт) 95 %, вода очищенная.

Форма выпуска

Сироп

Показания

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, трахеитов, бронхитов, а также при коклюше.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь, после еды (в связи с возможностью снижения аппетита). Взрослым по 1 столовой ложке 3 раза в день, детям от 3 до 6 лет - по 1/2 - 1 чайной ложке 3 раза в день, детям от 6 до 12 лет - по 1-2 чайные ложки 3 раза в день, детям старше 12 лет - по 1 десертной ложке 3 раза в день. Курс лечения 10-14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, Заболевания печени, Алкоголизм, Черепно-мозговая травма, Заболевания головного мозга, Эпилепсия, Хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации), Дефицит сахаразы /изомальтазы, Непереносимость фруктозы, Глюкозо-галактозная мальабсорбция, Беременность, Период грудного вскармливания, Детский возраст (до 3 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности и кормлении грудью.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, изжога.

Передозировка

В случае передозировки препарата возможна тошнота. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Препарат содержит 8-11% этанола. Содержание абсолютного спирта составляет: в 1 чайной ложке (5 мл) - до 0,43 г, в 1 десертной лс до 0,87 г, в 1 столовой ложке (15 мл) - до 1,3 г. В максимальной суточной дозе препарата для взрослых - 3 столовые ложки (45 мл) - содержится до 3,9 г абсолютного спирта. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Указание для больных сахарным диабетом: содержание сахарозы в 1 чайной ложке (5 мл) препарата соответствует примерно 0,22 ХЕ, в I десертной ложке (10 мл) - примерно 0,44 ХЕ, в 1 столовой ложке - примерно 0,66 ХЕ. Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами: В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°С в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.