Инструкция по применению
ПЕРТУССИН-Ч СИРОП 100Г

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Кировская фармацевтическая фабрика
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Тимьяна ползучего травы экстракт+[Калия бромид]
Количество в упаковке: 1

Описание

Густая жидкость коричневого цвета с ароматным запахом.

Действующее вещество

Тимьяна ползучего травы экстракт+[Калия бромид]

Состав

Состав на 100 гАктивные вещества:Чабреца экстракт жидкий - 12,0 гКалия бромид - 1,0 г:Вспомогательные вещества:Сахарный сироп (Сахароза, вода) - 82,0 гЭтанол (этиловый спирт) 95 % - 4,06 гВода очищенная - 0,94 г

Форма выпуска

Сироп

Показания

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, трахеитов, бронхитов, а также при коклюше.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь, после еды (в связи с возможностью снижения аппетита). Взрослым по 1 столовой ложке 3 раза в день,детям от 3 до 6 лет - по 1/2 - 1 чайной ложке 3 раза в день,детям от 6 до 12 лет - по 1-2 чайные ложки 3 раза в день,детям старше 12 лет - по 1 десертной ложке 3 раза в день. Курс лечения 10-14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия, хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации), дефицит сахаразы /изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст (до 3 лет).

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, изжога.

Передозировка

В случае передозировки препарата возможна тошнота. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, гак как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Препарат содержит 8-11 % этанола. Содержание абсолютного спирта составляет: в 1 чайной ложке (5 мл) - до 0,43 г, в 1 десертной ложке (10 мл) - до 0,87 г, в 1 столовой ложке (15 мл) - до 1,3 г. В максимальной суточной дозе препарата для взрослых - 3 столовые ложки (45 мл) - содержится до 3,9 г абсолютного спирта.В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.Указание для больных сахарным диабетом: содержание сахарозы в 1 чайной ложке (5 мл) препарата соответствует примерно 0,32 ХЕ, в 1 десертной ложке (10 мл) - примерно 0,64 ХЕ, в 1 столовой ложке - примерно 0,96 ХЕ.

Условия хранения

В сухом месте при температуре от 12 до 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте.