Инструкция по применению
Пикамилон Раствор для инъекций 10 % ампулы полимерные 2 мл 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Никотиноил гамма-аминомасляная кислота
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 200 мг/2 мл
Срок годности: 3.0

Описание

Прозрачная бесцветная или со слегка коричневатым оттенком жидкость

Действующее вещество

Никотиноил гамма-аминомасляная кислота

Состав

Действующее вещество: Никотиноил гамма-аминобутират натрия - 50 мг и 100 мг
Вспомогательные вещества: Хлористоводородной кислоты раствор 1 М* - до pH от 6,7 до 8,0 вода для инъекций - до 1 мл * - Хлористоводородной кислоты раствор 1 М получают из хлористоводородной кислоты концентрированной и воды для инъекций.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

Абсорбция - быстрая и полная при любых путях введения. Проникает через гематоэнцефалический барьер, длительно удерживается в тканях организма. Биодоступность - 50-88 %. Выводится, в основном, почками в неизмененном виде. Период полувыведения – 0,51 часа.

Показания

Взрослым: хроническая цереброваскулярная недостаточность (дисциркуляторная энцефалопатия, последствия нарушения мозгового кровообращения), состояние после черепно-мозговой травмы, синдром вегетативной дистонии, в составе комплексной терапии депрессивных расстройств различного генеза в пожилом возрасте. в составе комплексного лечения при хроническом алкоголизме (уменьшение астенических, астеноневротических, постпсихотических, предрецидивных состояний при алкогольной энцефалопатии). в составе комплексной терапии первичной открытоугольной глаукомы с компенсированным внутриглазным давлением (для стабилизации зрительной функции). в составе комплексной терапии синдрома вегетативной дистонии, сопровождающегося тревогой, страхом, повышенной раздражительностью, астенией, эмоциональной лабильностью. для улучшения переносимости физических и умственных нагрузок, повышения стрессоустойчивости (лицам, находящимся в напряженных и экстремальных условиях деятельности для восстановления физической работоспособности спортсменов, для повышения устойчивости к физическим и умственным нагрузкам). Детям старше 3 лет и взрослым в урологической практике при расстройствах мочеиспускания для улучшения адаптационной функции мочевого пузыря (снижение гипоксии детрузора).

Способ применения и дозы

Внутривенно капельно или струйно (медленно), внутримышечно. Перед капельным введением содержимое ампулы растворяют в 200 мл 0,9% раствора натрия хлорида. При хронической цереброваскулярной недостаточности: вводят по 100-200 мг 1 раз в сутки в течение 10 дней внутривенно, затем внутримышечно. Курс лечения 15 - 30 дней. При улучшении состояния переходят на пероральные формы в суточной дозе 50-150 мг. Повторный курс - через 5-6 месяцев. В составе комплексной терапии при лечении депрессивных состояний пожилого возраста: вводят 50-200 мг в сутки в течение 10-15 дней. При лечении хронического алкоголизма вводят 100 мг в сутки курсом 6-15 дней. Для восстановления работоспособности при повышенных нагрузках вводят в суточной дозе 200 мг в течение 10-15 дней, для спортсменов - в той же дозе в течение 14 дней тренировочного периода. В составе комплексной терапии синдрома вегетативной дистонии назначают по 100-200 мг в течение 10-15 дней. При комплексном лечении первичной открытоугольной глаукомы вводят по 100-200 мг в сутки в течение 10 дней. При лечении расстройств мочеиспускания: внутримышечно вводят по 100 мг (для детей от 3 до 10 лет), по 200 мг в сутки (для детей старше 11 лет и взрослых). Порядок работы с полимерной ампулой: 1.Взять ампулу и встряхнуть ее, удерживая за горлышко.2.Вращающими движениями повернуть и отделить клапан. 3.Через образовавшееся отверстие набрать с помощью иглы содержимое ампулы в шприц.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, хроническая почечная недостаточность, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 3 лет (у детей старше 3 лет применяется при расстройствах мочеиспускания).

Применение при беременности и кормлении грудью

В связи с тем, что безопасность применения препарата у беременных и кормящих женщин не установлена, применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Снижение артериального давления, головокружение, головная боль, легкая тошнота, раздражительность, возбуждение, тревожность, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд).

Передозировка

Усиление выраженности дозозависимых симптомов побочного действия. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Укорачивает действие барбитуратов, усиливает действие наркотических анальгетиков.

Особые указания

Возможно отрицательное влияние препарата на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстроты реакции (управление автомобилем, работа с движущимися механизмами и др.).

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении